
MATHEMATIQUES 2

PARTIE I

I.1 Soit $u \in]0, 1[$. φ_u est continue sur $[-\pi, \pi[$. De plus, φ_u étant 2π -périodique,

$$\varphi_u(\pi) = \varphi_u(-\pi) = \cos(-\pi u) = \cos(\pi u) = \varphi_u(\pi^-).$$

Par suite, φ_u est continue sur $[-\pi, \pi]$ et donc sur \mathbb{R} par 2π -périodicité.

Montrons que φ_u est paire. Déjà, pour $x \in [-\pi, \pi] \cup 2\pi\mathbb{Z}$, on a $\varphi_u(-x) = \varphi_u(x)$.

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$. Il existe un entier relatif k tel que $-\pi < x - 2k\pi < \pi$. En effet

$$-\pi < x - 2k\pi < \pi \Leftrightarrow (2k-1)\pi < x < (2k+1)\pi \Leftrightarrow 2k+1 < \frac{x}{\pi} < 2k-1 \Leftrightarrow k < \frac{1}{2}\left(\frac{x}{\pi} - 1\right) < k+1 \Leftrightarrow x \in \mathbb{E}\left(\frac{x-\pi}{2\pi}\right).$$

Mais alors $-x + 2k\pi \in]-\pi, \pi[$ et donc

$$\varphi_u(-x) = \varphi_u(-x + 2k\pi) = \varphi_u(-(-x + 2k\pi)) = \varphi_u(x - 2k\pi) = \varphi_u(x).$$

φ_u est donc paire.

Puisque φ_u est paire, pour tout entier naturel non nul, on a $b_n = 0$ puis, pour $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} a_n(u) &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos(ut) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\cos((u+n)t) + \cos((u-n)t)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin((u+n)t)}{u+n} + \frac{\sin((u-n)t)}{u-n} \right]_{t=0}^{t=\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{(-1)^n \sin(\pi u)}{u+n} + \frac{(-1)^n \sin(\pi u)}{u-n} \right) = \frac{2u \sin(\pi u)}{\pi} \times \frac{(-1)^n}{u^2 - n^2}. \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{2u \sin(\pi u)}{\pi} \times \frac{(-1)^n}{u^2 - n^2}.$$

φ_u est continue sur \mathbb{R} , clairement de classe C^1 par morceaux, et 2π -périodique. Le théorème de DIRICHLET permet d'affirmer que la série de FOURIER de φ_u converge en tout réel et que φ_u est égale en tout point de \mathbb{R} à la somme de sa série de FOURIER.

I.2 D'après la question I.1., pour $u \in]0, 1[$ et $t \in [-\pi, \pi]$, on a $\cos(\pi t) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} + \frac{2u \sin(\pi u)}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos(nt)}{u^2 - n^2}$.

Pour $t = \pi$, on obtient : $\frac{\sin(\pi u)}{\pi u} + \frac{2u \sin(\pi u)}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{u^2 - n^2} = \cos(\pi u)$, et donc, puisque $u\pi \in]0, \pi[$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2} = \frac{\pi}{\sin(\pi u)} \left(\cos(\pi u) - \frac{\sin(\pi u)}{\pi u} \right) = \frac{\pi \cos(\pi u)}{\sin(\pi u)} - \frac{1}{u}.$$

Finalement,

$$\forall u \in]0, 1[, \frac{\pi \cos(\pi u)}{\sin(\pi u)} - \frac{1}{u} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2}.$$

I.3. Soit $x \in [0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < 1 - x^2 \leq 1 - \frac{x^2}{n^2} \leq 1$. Par suite, $u_n(x)$ existe et est négatif. Ensuite,

$$u_n(x) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série de terme général $u_n(x)$ est donc absolument convergente.

La série de fonctions de terme général u_n converge simplement sur $[0, 1[$.

Pour chaque entier naturel non nul n , u_n est dérivable sur $[0, 1[$ et

$$\forall x \in [0, 1[, u'_n(x) = \frac{2x}{x^2 - n^2}.$$

Soit alors $a \in [0, 1[$. Pour n non nul donné, on a pour chaque x de $[0, a]$

$$|u'_n(x)| = \frac{2x}{n^2 - x^2} \leq \frac{2a}{n^2 - a^2} = |u'_n(a)|.$$

Quand n tend vers $+\infty$, $|u'_n(a)|$ est dominé par $\frac{1}{n^2}$. Par suite, la série de terme général $|u'_n(a)|$ converge et donc,

La série de fonctions de terme général u'_n converge normalement sur tout segment contenu dans $[0, 1[$.

Ainsi,

- La série de fonctions de terme général u_n , $n \geq 1$, converge simplement sur $[0, 1[$ vers une fonction que l'on note f .
- Chaque fonction u_n est de classe C^1 sur $[0, 1[$.
- La série de fonctions de terme général u'_n converge normalement et donc uniformément sur tout segment contenu dans $[0, 1[$.

D'après le théorème de dérivation terme à terme et d'après la question I.2, on peut affirmer que f est de classe C^1 sur $[0, 1[$ et que, pour tout réel $x \in]0, 1[$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2} = \frac{\pi \cos(\pi x)}{\sin(\pi x)} - \frac{1}{x}.$$

Mais alors, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour $x \in]0, 1[$,

$$f(x) = \ln \frac{\sin(\pi x)}{x} + C.$$

Quand x tend vers 0, on obtient (f étant définie et continue en 0)

$$f(0) = 0 = C + \ln \pi.$$

Finalement,

$$\forall x \in [0, 1[, \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \begin{cases} \ln\left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right) & \text{si } x \in]0, 1[\\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

I.4 I.4.1 Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{Z}$, la suite $(s_n(x))$ est nulle à partir d'un certain rang et donc converge vers 0. Si $x \notin \mathbb{Z}$, pour tout entier naturel n , $|s_n(x)| > 0$ et on a

$$\ln |s_n(x)| - \ln |s_{n-1}(x)| = \ln \left|1 - \frac{x^2}{n^2}\right|.$$

Puisque $\ln \left|1 - \frac{x^2}{n^2}\right|$ est dominée par $\frac{1}{n^2}$, la série de terme général $\ln \left|1 - \frac{x^2}{n^2}\right| = \ln |s_n(x)| - \ln |s_{n-1}(x)|$ converge. Mais alors la suite, $(\ln |s_n(x)|)$ converge et il en est de même de la suite $(|s_n(x)|)$ puis de la suite $(s_n(x))$ car cette suite est de signe constant à partir d'un certain rang.

La suite de fonctions (s_n) converge simplement sur \mathbb{R} .

I.4.2 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Par une récurrence immédiate, on a

$$s_n(x) = x \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right) = x \prod_{k=1}^n \frac{(k-x)(k+x)}{k^2}.$$

Par suite, puisque $x+1$ n'est pas entier et

$$\begin{aligned} s_n(x+1) &= (x+1) \prod_{k=1}^n \frac{(k-1-x)(k+1+x)}{k^2} = \prod_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \prod_{k=1}^n (k-1-x) \prod_{k=0}^n (k+1+x) \\ &= \prod_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \prod_{k=0}^{n-1} (k-x) \prod_{k=1}^{n+1} (k+x) = \frac{n+1+x}{n-x} (-x) \prod_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \prod_{k=1}^n (k-x) \prod_{k=1}^n (k+x) \\ &= \frac{n+1+x}{x-n} s_n(x). \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, s_n(x+1) = \frac{n+1+x}{x-n} s_n(x).$$

Quand n tend vers $+\infty$, on obtient pour un x réel donné non entier, $s(x+1) = -s(x)$. Si x est entier, on a directement $s(x+1) = 0 = -s(x)$. Finalement,

$$\forall x \in \mathbb{R}, s(x+1) = -s(x).$$

I.4.3 Soit $x \in]0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ donné, on a

$$s_n(x) = x \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right) = x \exp\left(\sum_{k=1}^n u_k(x)\right).$$

Quand n tend vers $+\infty$, par continuité de la fonction exponentielle sur \mathbb{R} , on obtient

$$s(x) = x \exp\left(\ln \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi},$$

ce qui reste vrai pour $x = 0$. Enfin, soit x un réel quelconque. Posons $p = E(x)$. Alors $x - p \in [0, 1[$ et

$$s(x) = (-1)^p s(x-p) = \frac{(-1)^p \sin(\pi(x-p))}{\pi} = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}.$$

Finalement

$$\forall x \in \mathbb{R}, s(x) = x \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}.$$

PARTIE II

II.1 II.1.1 Soit $p \in \mathbb{N}$. Pour $n > p$, on a $0 \leq p \leq n-1$ et donc

$$f_n(-p) = \frac{n^{-p}}{(n-1)!} \prod_{k=0}^{n-1} (-p+k) = 0.$$

Par suite,

$$\forall p \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(-p) = 0.$$

II.1.2 Soit $x \notin \mathbb{Z}^-$. Pour tout naturel non nul n , $f_n(x)$ n'est pas nul et

$$\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-x} (x+n).$$

Posons $N_x = 1$ si $x > 0$ et $N_x = E(-x) + 1$ si $x < 0$. Pour $n \geq N_x$, on a $\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} > 0$ de sorte que $\ln \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}$ existe. Ensuite, quand n tend vers $+\infty$, on a

$$\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-x} = \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 - \frac{x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = 1 + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

et donc,

$$\ln \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} \underset{+\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

On en déduit que la série de terme général $\ln \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \ln(f_{n+1}(x)) - \ln(f_n(x))$ converge. On sait qu'il en est de même de la suite $(\ln(f_n(x)))$ et donc de la suite $(f_n(x))$.

$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}^-$, la suite $(f_n(x))$ converge.

II.2 Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$x f_n(x+1) = x \frac{n^{-(x+1)}}{(n-1)!} \prod_{k=0}^{n-1} (k+1+x) = x \frac{n^{-(x+1)}}{(n-1)!} \prod_{k=1}^n (k+x) = \frac{1}{n} (n+x) \frac{n^{-x}}{(n-1)!} \prod_{k=0}^{n-1} (k+x) = \frac{n+x}{n} f_n(x).$$

Quand n tend vers $+\infty$, on obtient :

$\forall x \in \mathbb{R}$, $x f(x+1) = f(x)$.

Ensuite, $f_n(1) = \frac{1}{n} \frac{n!}{(n-1)!} = 1$ et quand n tend vers $+\infty$, on obtient $f(1) = 1$. Mais alors, immédiatement par récurrence,

$\forall n \in \mathbb{N}^*$, $f(n) = \frac{1}{(n-1)!}$.

II.3 Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}^-$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} f_n(x) f_n(1-x) &= n^{-x} n^{-1+x} \frac{1}{(n-1)!^2} \prod_{k=0}^{n-1} (x+k) \prod_{k=0}^{n-1} (1-x+k) \\ &= \frac{1}{n} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2} \prod_{k=0}^{n-1} (k+x) \prod_{k=1}^n (k-x) \\ &= \frac{n^2}{n(x+n)} x \prod_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \prod_{k=1}^n (k^2 - x^2) = \frac{n}{n+x} x \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{k^2}\right). \end{aligned}$$

Quand n tend vers $+\infty$, le premier membre de cette égalité tend vers $f(x)f(1-x)$ et le second membre vers $\frac{\sin(\pi x)}{\pi}$ d'après la question I.4.3., ce qui montre que $f(x)f(1-x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}$.

Quand $x \in \mathbb{Z}^-$, d'après la question II.1.1, $f(x) = 0$ et donc encore une fois $f(x)f(1-x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}$. Finalement,

$\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x)f(1-x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi}$.

II.4 II.4.1 Si k est un entier négatif ou nul, $f(k)f(1-k) = \frac{\sin(k\pi)}{\pi} = 0$. De plus, d'après II.2, puisque $n = 1 - k$ est un entier naturel non nul, $f(1-k) = \frac{1}{n!} \neq 0$. On en déduit que $f(k) = 0$. Donc,

f s'annule sur \mathbb{Z}^- .

Ainsi, si px est un entier négatif ou nul, $f(px) = 0$. Pour montrer que la relation (1) est vérifiée (quand px est un entier négatif ou nul), il suffit de vérifier que $\prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p}) = 0$. Pour cela, on va montrer que l'un des $x + \frac{k}{p}$, $0 \leq k \leq p-1$, est un entier négatif ou nul.

La division euclidienne de l'entier naturel $-px$ par l'entier naturel non nul p fournit $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que

$$-px = qp + r \text{ et } 0 \leq r \leq p-1.$$

Mais alors, r est élément de $\{0, \dots, p-1\}$ et vérifie $x + \frac{r}{p} = -q \in \mathbb{Z}^-$. Par suite, $f(x + \frac{r}{p}) = 0$. Finalement, si $px \in \mathbb{Z}^-$,

$$f(px) = 0 = (2\pi)^{\frac{p-1}{2}} p^{-px + \frac{1}{2}} \prod_{k=0}^{p-1} f\left(x + \frac{k}{p}\right).$$

II.4.2

Soient $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ puis x un réel tel que $px \notin \mathbb{Z}^-$. On a d'une part

$$\begin{aligned} p^{px-1} f_{pn}(px) &= p^{px-1} \frac{(pn)^{-px}}{(pn-1)!} \prod_{k=0}^{pn-1} (px+k) \\ &= p^{-1} n^{-px} \frac{1}{(pn-1)!} \prod_{\substack{0 \leq q \leq n-1 \\ 0 \leq r \leq p-1}} (px+qp+r) \text{ (en effectuant la division de chaque } k \in \llbracket 0, pn-1 \rrbracket \text{ par } p) \\ &= p^{-1} n^{-px} \frac{1}{(pn-1)!} \prod_{r=0}^{p-1} \left(\prod_{q=0}^{n-1} (px+qp+r) \right) \end{aligned}$$

et d'autre part

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^{p-1} f_n\left(x + \frac{k}{p}\right) &= \prod_{k=0}^{p-1} \left(\frac{n^{-x-\frac{k}{p}}}{(n-1)!} \prod_{i=0}^{n-1} \left(x + \frac{k}{p} + i\right) \right) \\ &= (n^{-x})^p (n^{-\frac{1}{p}})^{1+2+\dots+(p-1)} \frac{1}{((n-1)!)^p} \prod_{r=0}^{p-1} \left(\prod_{q=0}^{n-1} \left(x + \frac{r}{p} + q\right) \right) \text{ (simplement en changeant de notations)} \\ &= n^{-px - \frac{p(p-1)}{2}} \frac{1}{((n-1)!)^p} \prod_{r=0}^{p-1} \left(\frac{1}{p^n} \prod_{q=0}^{n-1} (px+qp+r) \right) \\ &= n^{-px - \frac{p-1}{2}} \frac{1}{((n-1)!)^p} \frac{1}{p^{np}} \prod_{r=0}^{p-1} \left(\prod_{q=0}^{n-1} (px+qp+r) \right) \end{aligned}$$

Par suite, (puisque aucun des $x + \frac{k}{p} = \frac{px+k}{p}$ n'est nul)

$$\frac{p^{px-1} f_{pn}(px)}{\prod_{k=0}^{p-1} f_n\left(x + \frac{k}{p}\right)} = \frac{p^{-1} n^{-px} \frac{1}{(pn-1)!}}{n^{-px - \frac{p-1}{2}} \frac{1}{((n-1)!)^p} \frac{1}{p^{np}}} = \frac{n^{\frac{p-1}{2}} p^{np-1} (n-1)!^p}{(pn-1)!}$$

Ainsi,

$$\frac{p^{px-1} f_{pn}(px)}{\prod_{k=0}^{p-1} f_n(x + \frac{k}{p})} = A_{p,n},$$

où $A_{p,n} = \frac{n^{\frac{p-1}{2}} p^{np-1} (n-1)!^p}{(pn-1)!}$ ne dépend pas de x .

D'après la question II.1.2, puisque $px \notin \mathbb{Z}^-$, la suite $(f_{pn}(px))_{n \in \mathbb{N}^*}$ a une limite non nulle à savoir $f(px)$. D'autre part, pour $0 \leq k \leq p-1$,

$$x + \frac{k}{p} \in \mathbb{Z}^- \Rightarrow px + k \in p\mathbb{Z}^- \Rightarrow px \in -k + p\mathbb{Z}^- \Rightarrow px \in \mathbb{Z}^-,$$

et donc par contraposition,

$$px \notin p\mathbb{Z}^- \Rightarrow \forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, x + \frac{k}{p} \notin \mathbb{Z}^-.$$

On en déduit que $\forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, f(x + \frac{k}{p}) \neq 0$ et donc que la suite $\left(\prod_{k=0}^{p-1} f_n(x + \frac{k}{p}) \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ a une limite non nulle quand

n tend vers $+\infty$ à savoir $\prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p})$. Mais alors le rapport $\frac{p^{px-1} f_{pn}(px)}{\prod_{k=0}^{p-1} f_n(x + \frac{k}{p})} = A_{p,n}$ a une limite réelle positive quand n

tend vers $+\infty$, limite que l'on note A_p . Quand n tend vers $+\infty$, on obtient

$$f(px) = A_p p^{-px+1} \prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p}).$$

II.4.3 On évalue l'égalité précédente en $x = \frac{1}{p}$ ($x = \frac{1}{p} \Rightarrow px = 1 \notin \mathbb{Z}^-$). On obtient (puisque $f(1) = 1$ d'après la question II.2)

$$1 = f(1) = A_p \prod_{k=0}^{p-1} f\left(\frac{k+1}{p}\right) = A_p \prod_{k=1}^p f\left(\frac{k}{p}\right) = A_p \prod_{k=1}^{p-1} f\left(\frac{k}{p}\right) = A_p \prod_{k'=1}^{p-1} f\left(\frac{p-k'}{p}\right) = A_p \prod_{k=1}^{p-1} f\left(1 - \frac{k}{p}\right).$$

Ainsi,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, A_p = \frac{1}{\prod_{k=1}^{p-1} f\left(\frac{k}{p}\right)} = \frac{1}{\prod_{k=1}^{p-1} f\left(1 - \frac{k}{p}\right)}.$$

Mais alors, d'après la question II.3.,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, A_p^2 = \frac{1}{\prod_{k=1}^{p-1} f\left(\frac{k}{p}\right) f\left(1 - \frac{k}{p}\right)} = \frac{\pi^{p-1}}{\prod_{k=1}^{p-1} \sin\left(\frac{k\pi}{p}\right)} (*).$$

II.4.4

$$\begin{aligned} (X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1)^2 &= \left(\frac{X^p - 1}{X - 1}\right)^2 = \left(\frac{\prod_{k=0}^{p-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{p}})}{X - 1}\right)^2 = \left(\prod_{k=1}^{p-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{p}})\right)^2 \\ &= \prod_{k=1}^{p-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{p}}) \prod_{k=1}^{p-1} (X - e^{-\frac{2ik\pi}{p}}) \text{ (quand } k \text{ décrit } \llbracket 1, p-1 \rrbracket, e^{-\frac{2ik\pi}{p}} \text{ décrit aussi } \mathbb{U}_p \setminus \{1\}) \\ &= \prod_{k=1}^{p-1} (X - e^{\frac{2ik\pi}{p}})(X - e^{-\frac{2ik\pi}{p}}) = \prod_{k=1}^{p-1} (X^2 - 2X \cos \frac{2k\pi}{p} + 1). \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, (x^{p-1} + x^{p-2} + \dots + x + 1)^2 = \prod_{k=1}^{p-1} (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{p} + 1).$$

Pour $x = 1$, on obtient en particulier

$$p^2 = \prod_{k=1}^{p-1} (2 - 2 \cos \frac{2k\pi}{p}) = \prod_{k=1}^{p-1} 4 \sin^2 \frac{k\pi}{p} = 2^{2(p-1)} \left(\prod_{k=1}^{p-1} \sin \frac{k\pi}{p} \right)^2.$$

L'égalité (*) montre que $\prod_{k=1}^{p-1} \sin \frac{k\pi}{p} > 0$ et donc que

$$\prod_{k=1}^{p-1} \sin \frac{k\pi}{p} = \sqrt{\frac{p^2}{2^{2(p-1)}}} = \frac{p}{2^{p-1}}.$$

Puisque A_p est un réel positif, l'égalité (*) fournit encore

$$A_p = \sqrt{\frac{p^{p-1}}{\prod_{k=1}^{p-1} \sin \frac{k\pi}{p}}} = \sqrt{\frac{(2\pi)^{p-1}}{p}} = (2\pi)^{\frac{p-1}{2}} p^{-\frac{1}{2}}.$$

On obtient finalement

$$f(px) = A_p p^{-px+1} \prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p}) = (2\pi)^{\frac{p-1}{2}} p^{-\frac{1}{2}} p^{-px+1} \prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p}) = (2\pi)^{\frac{p-1}{2}} p^{-px+\frac{1}{2}} \prod_{k=0}^{p-1} f(x + \frac{k}{p}).$$

PARTIE III

III.1 Soit x un réel. La fonction $f : t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ est continue sur $]0, +\infty[$ et donc intégrable sur tout segment de $]0, +\infty[$.

- Quand t tend vers 0, $e^{-t}t^{x-1} \sim t^{x-1} > 0$. Donc f est intégrable sur un voisinage de 0 si et seulement si la fonction $t \mapsto t^{x-1}$ est intégrable sur un voisinage de 0 ce qui équivaut à $x > 0$.

- Quand t tend vers $+\infty$, d'après les théorèmes de croissances comparées, on a dans tous les cas $e^{-t}t^{x-1} = o(\frac{1}{t^2})$ et donc f est dans tous les cas intégrable au voisinage de $+\infty$.

En résumé f est intégrable sur $]0, +\infty[$ si et seulement si $x > 0$.

$$\mathcal{D} =]0, +\infty[.$$

Montrons alors que la fonction Γ est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$. Pour cela, on se donne deux réels a et b tels que $0 < a < b$ et on considère la fonction $F : [a, b] \times]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. La fonction F admet des dérivées partielles à tout ordre par rapport à sa première variable x sur $[a, b] \times]0, +\infty[$ et

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [a, b], \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t) = (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t}.$$

- Pour chaque $x \in [a, b]$, la fonction $t \mapsto F(x, t)$ est continue par morceaux et intégrable sur $]0, +\infty[$ (d'après le début de la question).

- Pour chaque $k \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t)$ est définie et continue sur $[a, b]$.

- Soient $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [a, b]$. La fonction $t \mapsto \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t)$ est définie et continue par morceaux sur $]0, +\infty[$. De plus,

Maintenant, si $t \in]0, 1]$, $\left| \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t) \right| = |\ln t|^k t^{x-1} e^{-t} = |\ln t|^k e^{(x-1) \ln t} e^{-t} \leq |\ln t|^k e^{(a-1) \ln t} e^{-t} = |\ln t|^k t^{a-1} e^{-t}$ et si $t \in [1, +\infty[$, $\left| \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq |\ln t|^k t^{b-1} e^{-t}$. En résumé,

$$\forall (x, t) \in [a, b] \times]0, +\infty[, \left| \frac{\partial^k F}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi_k(t) \quad \varphi_k(t) = |\ln t|^k \text{Max}\{t^{a-1}, t^{b-1}\} e^{-t}.$$

La fonction φ_k est déjà continue par morceaux et positive sur $]0, +\infty[$, négligeable devant $\frac{1}{t^2}$ au voisinage de $+\infty$ d'après les théorèmes de croissances comparées. Il reste à vérifier que cette fonction est intégrable au voisinage de 0. Pour $t \in]0, 1]$, on a

$$t^{1-\frac{a}{2}} \varphi_k(t) = t^{1-\frac{a}{2}} |\ln t|^k t^{a-1} e^{-t} = |\ln t|^k t^{\frac{a}{2}} e^{-t},$$

et donc, puisque $\frac{a}{2} > 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} t^{1-\frac{a}{2}} \varphi_k(t) = 0$ d'après les théorèmes de croissances comparées. On en déduit que quand t tend vers 0, $\varphi_k(t) = o(t^{-1+\frac{a}{2}})$ et donc que φ_k est intégrable sur un voisinage de 0 puisque $-1 + \frac{a}{2} > -1$.

Finalement, la fonction φ_k est continue par morceaux, positive et intégrable sur $]0, +\infty[$.

D'après le théorème de dérivation des intégrales à paramètres (théorème de LEIBNIZ), la fonction Γ est de classe C^∞ sur tout segment contenu dans $]0, +\infty[$ et donc sur $]0, +\infty[$ et les dérivées successives s'obtiennent par dérivation sous le signe somme :

$$\Gamma \text{ est de classe } C^\infty \text{ sur }]0, +\infty[\text{ et}$$

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, +\infty[, \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

III.2 III.2.1 Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, +\infty[$. Vérifions tout d'abord l'intégrabilité de la fonction $u \mapsto (1-u)^n u^{x-1}$. Cette fonction est continue sur $]0, 1]$, positive et équivalente quand u tend vers 0 à la fonction $u \mapsto u^{x-1}$ qui est intégrable sur un voisinage de 0 puisque $x-1 > -1$. Donc la fonction $u \mapsto (1-u)^n u^{x-1}$ est intégrable sur $]0, 1]$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in]0, +\infty[, g_n(x) \text{ existe.}$$

Soient $n \geq 1$, $x \in]0, +\infty[$ puis $\varepsilon \in]0, 1]$. Les deux fonctions $u \mapsto (1-u)^n$ et $u \mapsto \frac{u^x}{x}$ sont de classe C^1 sur le segment $[\varepsilon, 1]$. On peut donc effectuer une intégration par parties qui fournit :

$$\int_\varepsilon^1 (1-u)^n u^{x-1} du = \left[(1-u)^n \frac{u^x}{x} \right]_\varepsilon^1 + \frac{n}{x} \int_\varepsilon^1 (1-u)^{n-1} u^x du = -(1-\varepsilon)^n \frac{\varepsilon^x}{x} + \frac{n}{x} \int_\varepsilon^1 (1-u)^{n-1} u^x du.$$

Quand ε tend vers 0, au vu de l'intégrabilité sur $]0, 1]$ de toutes les fonctions considérées, on obtient $g_n(x) = \frac{n}{x} g_{n-1}(x+1)$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, +\infty[, g_n(x) = \frac{n}{x} g_{n-1}(x+1).$$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$. En réitérant on obtient

$$g_n(x) = \frac{n}{x} \times \frac{n-1}{x+1} \times \dots \times \frac{1}{x+n-1} g_0(x+n) = \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \int_0^1 u^{x+n-1} du = \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \times \frac{1}{x+n}.$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, +\infty[, g_n(x) = \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \times \frac{1}{x+n}.$$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$. En posant $u = \frac{t}{n}$ ou encore $t = nu$ et donc $dt = n du$, on obtient

$$\begin{aligned} G_n(x) &= \int_0^1 \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt = \int_0^1 (1-u)^n (nu)^{x-1} n du = n^x g_n(x) \\ &= \frac{n^x n!}{\prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \times \frac{1}{x+n} = \frac{(n-1)!}{n^{-x} \prod_{k=0}^{n-1} (x+k)} \times \frac{n}{x+n} = \frac{n}{(n+x) \Gamma_n(x)}. \end{aligned}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in]0, +\infty[, G_n(x) = \frac{n}{(n+x)f_n(x)}.$$

III.2.2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'inégalité à démontrer est claire quand $t = n$. D'autre part, pour $t \in [0, n[$,

$$e^{-t} \geq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \Leftrightarrow -t \geq n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \Leftrightarrow \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -\frac{t}{n}.$$

Maintenant, la fonction $h : u \mapsto \ln(1+u)$ est deux fois dérivable sur $] -1, +\infty[$ et pour $u > -1$, $h''(u) = -\frac{1}{(1+u)^2} < 0$. On en déduit que la fonction h est concave et en particulier que son graphe est en dessous de sa tangente en $(0,0)$ ce qui fournit

$$\forall u > -1, \ln(1+u) \leq u.$$

Pour $u = -\frac{t}{n} \in] -1, 0[\subset] -1, +\infty[$, on obtient $\ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -\frac{t}{n}$ et l'inégalité de l'énoncé est également vraie si $t \in [0, n[$.

De même, si $t \in [0, n]$, $\frac{t}{n} \in [0, 1] \subset] -1, +\infty[$ et en posant $u = \frac{t}{n}$, on obtient $\ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) \leq \frac{t}{n}$ et donc $e^t \geq \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [0, n], e^{-t} \geq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \text{ et } e^t \geq \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n.$$

Mais alors, d'une part $e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \geq 0$ et d'autre part $-e^t \leq -\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n$ et donc, puisque $\left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \geq 0$, $-e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq -\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = -\left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n$. On en déduit que

$$e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = e^{-t} \left[1 - e^t \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n\right] \leq e^{-t} \left[1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n\right].$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [0, n], 0 \leq e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t} \left[1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n\right].$$

III.2.3 Soit $a \in [0, 1]$.

- Pour $n = 1$, $(1-a)^1 = 1-a \geq 1-a = 1-1 \times a$. L'inégalité à démontrer est donc vraie quand $n = 1$.
- Soit $n \geq 1$. Supposons que $(1-a)^n \geq 1-na$. Alors puisque $1-a \geq 0$,

$$(1-a)^{n+1} = (1-a)^n(1-a) \geq (1-na)(1-a) = 1-(n+1)a + a^2 \geq 1-(n+1)a.$$

On a montré par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a \in [0, 1], (1-a)^n \geq 1-na.$$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0, n]$. $\frac{t^2}{n^2} \in [0, 1]$ et donc $\left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \geq 1 - n \times \frac{t^2}{n^2} = 1 - \frac{t^2}{n}$ puis $1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n \leq \frac{t^2}{n}$ et enfin $e^{-t} \left[1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n\right] \leq e^{-t} \frac{t^2}{n}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [0, n], 0 \leq e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq \frac{t^2 e^{-t}}{n}.$$

III.2.4 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$.

$$\begin{aligned}
|\Gamma(x) - G_n(x)| &= \left| \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt - \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} dt \right| = \left| \int_0^n \left(e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \right) dt + \int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \right| \\
&= \int_0^n \left(e^{-t} - \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \right) t^{x-1} dt + \int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \leq \int_0^n \frac{t^2 e^{-t}}{n} t^{x-1} dt + \int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \\
&= \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x+1} dt + \int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt = \frac{\Gamma(x+2)}{n} + \int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.
\end{aligned}$$

Puisque la fonction $t \mapsto e^{-t} t^{x-1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$, $\int_n^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Comme $\frac{\Gamma(x+2)}{n}$ tend aussi vers 0 quand n tend vers $+\infty$, on a montré que

$$\forall x \in]0, +\infty[, \lim_{n \rightarrow +\infty} G_n(x) = \Gamma(x).$$

Soit $x > 0$. Alors $x \notin \mathbb{Z}^-$ et donc $f(x) \neq 0$. D'après la question III.2.1, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n(x) = \frac{1}{f(x)}$ ce qui montre que $\Gamma(x) = \frac{1}{f(x)}$ et donc que $\Gamma(x) \neq 0$ puis $f(x) = \frac{1}{\Gamma(x)}$.

$$\forall x \in]0, +\infty[, f(x) = \frac{1}{\Gamma(x)}.$$

III.3 D'après la question III.1, la fonction Γ est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$. Comme la fonction Γ ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$, f est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$.

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n , f est de classe C^∞ sur $] -n, +\infty[$.

- f est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$ et le résultat est vrai pour $n = 0$.
- Soit $n \geq 0$. Supposons que f soit de classe C^∞ sur $] -n, +\infty[$. D'après la question II.2, pour tout réel x on a $f(x) = xf(x+1)$. Par hypothèse de récurrence, la fonction $x \mapsto f(x+1)$ est de classe C^∞ sur $] -n-1, +\infty[=] -(n+1), +\infty[$ et il en est de même de f .

On a montré par récurrence que

$$f \text{ est de classe } C^\infty \text{ sur } \mathbb{R}.$$