

Partie I -

I.A -

I.A.1) Pour chaque $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{C})$, on a $N_\infty(A) = \max\{\|L_i\|_1, 1 \leq i \leq n\}$ où L_1, \dots, L_n désignent les lignes de A .
Donc

- $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), N_\infty(A) \in \mathbb{R}^+$.
- $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), N_\infty(A) = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, L_i = 0 \Rightarrow A = 0$.
- $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \forall \lambda \in \mathbb{C}$,

$$N_\infty(\lambda A) = \max\{\|\lambda L_i\|_1, 1 \leq i \leq n\} = \max\{|\lambda| \|L_i\|_1, 1 \leq i \leq n\} = |\lambda| \max\{\|L_i\|_1, 1 \leq i \leq n\} = |\lambda| N_\infty(A).$$

- Soit $(A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2$. Notons $L_i, 1 \leq i \leq n$, et $L'_i, 1 \leq i \leq n$, les lignes de A et B respectivement.
Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\|L_i + L'_i\|_1 \leq \|L_i\|_1 + \|L'_i\|_1 \leq N_\infty(A) + N_\infty(B),$$

et donc $N_\infty(A + B) = \max\{\|L_i + L'_i\|_1, 1 \leq i \leq n\} \leq N_\infty(A) + N_\infty(B)$.

Finalement

N_∞ est une norme sur $M_n(\mathbb{C})$.

I.A.2) a) Soient $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$ et $z = (z_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{C}^n$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$|(Az)_i| = \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j} z_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \times |z_j| \leq \|z\|_\infty \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \|L_i\|_1 \|z\|_\infty \leq N_\infty(A) \|z\|_\infty,$$

et donc

$$\|Az\|_\infty = \max\{|(Az)_i|, 1 \leq i \leq n\} \leq N_\infty(A) \|z\|_\infty.$$

$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \forall z \in \mathbb{C}^n, \|Az\|_\infty \leq N_\infty(A) \|z\|_\infty.$

b) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. D'après a), on a déjà $\sup \left\{ \frac{\|Az\|_\infty}{\|z\|_\infty}, z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} \right\} \leq N_\infty(A)$. On note alors $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ un indice i tel que $N_\infty(A) = \|L_{i_0}\|_1$. On note $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ des complexes de module 1 tels que, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varepsilon_j a_{i_0,j} = |a_{i_0,j}|$ (si $a_{i_0,j} \neq 0$ on prend $\varepsilon_j = \frac{|a_{i_0,j}|}{a_{i_0,j}}$ et si $a_{i_0,j} = 0$, on prend $\varepsilon_j = 1$) puis on pose $z = (\varepsilon_j)_{1 \leq j \leq n}$. On a $\|z\|_\infty = 1$ et

$$|(A(z))_{i_0}| = \left| \sum_{j=1}^n a_{i_0,j} \varepsilon_j \right| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}| = \|L_{i_0}\|_1,$$

ce qui montre que $\frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty} \geq \frac{|(A(z))_{i_0}|}{\|z\|_\infty} = \|L_{i_0}\|_1$. Comme d'autre part, $\frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty} \leq \|L_{i_0}\|_1$, on a donc

$$\frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty} = \|L_{i_0}\|_1 = N_\infty(A).$$

On a montré que $\sup \left\{ \frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty}, z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} \right\} = \max \left\{ \frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty}, z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} \right\} = N_\infty(A)$.

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), N_\infty(A) = \max \left\{ \frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty}, z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\} \right\}.$$

c) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $|\lambda| = \rho(A)$ et z un vecteur propre de A associé à λ .

$$N_\infty(A) \geq \frac{\|A(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty} = \frac{\|\lambda z\|_\infty}{\|z\|_\infty} = |\lambda| = \rho(A).$$

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \rho(A) \leq N_\infty(A).$$

I.A.3 Soit $(A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2$. Pour $z \in \mathbb{C}^n$,

$$\|AB(z)\|_\infty \leq N_\infty(A)\|B(z)\|_\infty \leq N_\infty(A)N_\infty(B)\|z\|_\infty.$$

On en déduit que pour $z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$,

$$\frac{\|AB(z)\|_\infty}{\|z\|_\infty} \leq N_\infty(A)N_\infty(B),$$

et donc que $N_\infty(AB) \leq N_\infty(A)N_\infty(B)$.

$$\forall (A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2, N_\infty(AB) \leq N_\infty(A)N_\infty(B).$$

I.A.4 a) Soit $Q \in GL_n(\mathbb{C})$.

- $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), N_Q(A) \geq 0$.
- $\forall A \in M_n(\mathbb{C}),$

$$N_Q(A) = 0 \Rightarrow N_\infty(Q^{-1}AQ) = 0 \Rightarrow Q^{-1}AQ = 0 \Rightarrow A = 0,$$

car Q et Q^{-1} sont inversibles et donc simplifiables.

- Pour $A \in M_n(\mathbb{C})$ et $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$N_Q(\lambda A) = N_\infty(Q^{-1}(\lambda A)Q) = |\lambda|N_\infty(Q^{-1}AQ) = |\lambda|N_Q(A).$$

- Pour $(A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2$,

$$N_Q(A+B) = N_\infty(Q^{-1}AQ + Q^{-1}BQ) \leq N_\infty(Q^{-1}AQ) + N_\infty(Q^{-1}BQ) = N_Q(A) + N_Q(B).$$

- Pour $(A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2$,

$$N_Q(AB) = N_\infty(Q^{-1}ABQ) = N_\infty(Q^{-1}AQQ^{-1}BQ) \leq N_\infty(Q^{-1}AQ)N_\infty(Q^{-1}BQ) = N_Q(A)N_Q(B).$$

Finalement,

$$\forall Q \in GL_n(\mathbb{C}), N_Q \text{ est une norme matricielle sur } GL_n(\mathbb{C}).$$

b) Puisque $\dim_{\mathbb{C}}(M_n(\mathbb{C})) < +\infty$, N_∞ et N_Q sont équivalentes. On en déduit qu'il existe deux réels strictement positifs α et β tels que $\alpha N_\infty \leq N_Q \leq \beta N_\infty$. Soit $C_Q = \max\{\frac{1}{\alpha}, \beta\}$. On a $\beta \leq C_Q$ puis $\frac{1}{\alpha} \leq C_Q$ et donc $\frac{1}{C_Q} \leq \alpha$. On a donc $\frac{1}{C_Q}N_\infty \leq N_Q \leq C_Q N_\infty$.

$$\forall Q \in GL_n(\mathbb{C}), \exists C_Q \in]0, +\infty[/ \forall A \in M_n(\mathbb{C}), \frac{1}{C_Q}N_\infty(A) \leq N_Q(A) \leq C_Q N_\infty(A).$$

I.B - Soit $\varepsilon > 0$.

Soit $T \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice triangulaire supérieure. Pour $s > 0$,

$$\begin{aligned} D_s^{-1}TD_s &= \begin{pmatrix} 1/s & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1/s^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2} & \dots & t_{1,n} \\ 0 & t_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & t_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & s^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} t_{1,1} & t_{1,2}s & \dots & \dots & t_{1,n}s^{n-1} \\ 0 & t_{2,2} & \ddots & & t_{2,n}s^{n-2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & t_{n-1,n}s \\ 0 & \dots & \dots & 0 & t_{n,n} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On a donc $\lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ s > 0}} D_s^{-1}TD_s = D_{(t_{1,1}, t_{2,2}, \dots, t_{n,n})}$ et par continuité de N_∞ ,

$$\lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ s > 0}} N_{D_s}(T) = N_\infty(D_{(t_{1,1}, t_{2,2}, \dots, t_{n,n})}) = \max\{|t_{i,i}|, 1 \leq i \leq n\} = \rho(T).$$

Soit alors $A \in M_n(\mathbb{C})$. On sait que A est triangulable et donc il existe une matrice T triangulaire supérieure et une matrice inversible P telles que $A = PTP^{-1}$. On choisit alors $s > 0$ tel que $N_{D_s}(T) < \rho(T) + \varepsilon$ et on pose $Q = PD_s$. On a

$$N_Q(A) = N_\infty((PD_s)^{-1}A(PD_s)) = N_{D_s}(P^{-1}AP) = N_{D_s}(T) < \rho(T) + \varepsilon = \rho(A) + \varepsilon.$$

Maintenant, d'après I.A.4), N_Q est une norme matricielle et on a montré que

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \forall \varepsilon > 0, \text{ il existe une norme matricielle } N_\varepsilon \text{ telle que } N_\varepsilon(A) < \rho(A) + \varepsilon.$$

I.C - Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

• Supposons que $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$. Soient λ une valeur propre de A et x un vecteur propre associé. Pour tout entier naturel k , on a $A^k x = \lambda^k x$ et donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} (\lambda^k x) = 0$. Puisque x n'est pas nul, on en déduit que $\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda^k = 0$ et donc que $|\lambda| < 1$. Ainsi, toute valeur propre de A est de module strictement inférieur à 1 et finalement $\rho(A) < 1$.

• Supposons que $\rho(A) < 1$. On choisit une norme matricielle N telle que $N(A) < \rho(A) + \frac{1 - \rho(A)}{2} = \frac{1 + \rho(A)}{2}$. Pour tout entier naturel k , on a

$$N(A^k) \leq (N(A))^k \leq \left(\frac{1 + \rho(A)}{2}\right)^k,$$

et puisque $0 \leq \frac{1 + \rho(A)}{2} < 1$, on a $\lim_{k \rightarrow +\infty} N(A^k) = 0$ et donc $\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$.


Finalement,

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \left(\lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0 \Leftrightarrow \rho(A) < 1\right).$$

Partie II -

II.A -

II.A.1) $G_L(A)$ est la réunion du disque de centre le point d'affixe $4 + 3i$ et de rayon $L_1 = 4$, du disque de centre le point d'affixe $-1 + i$ et de rayon $L_2 = 1$, du disque de centre le point d'affixe $5 + 6i$ et de rayon $L_3 = 3 + \sqrt{2}$ et du disque de centre le point d'affixe $-5 - 5i$ et de rayon $L_4 = 5$. $G_C(A)$ est la réunion du disque de centre le point d'affixe $4 + 3i$ et de rayon $C_1 = 2 + \sqrt{2}$, du disque de centre le point d'affixe $-1 + i$ et de rayon $C_2 = 4$, du disque de centre le point d'affixe $5 + 6i$ et de rayon $C_3 = 4$ et du disque de centre le point d'affixe $-5 - 5i$ et de rayon $C_4 = 3$.



I.A.2) a) Soit $Z = (z_j)_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$. Soit $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ un indice tel que $|z_p| = \|Z\|_\infty > 0$. Dans cette question, les L_i sont les $\sum_{j \neq i} |m_{i,j}|$.

$$\begin{aligned}
 MZ = 0 &\Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{i=1}^n m_{i,j} z_j = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |m_{i,i} z_i| = \left| - \sum_{j \neq i} m_{i,j} z_j \right| \\
 &\Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |m_{i,i}| \times |z_i| \leq \sum_{j \neq i} |m_{i,j}| |z_j| \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |m_{i,i}| \times |z_i| \leq L_i \|Z\|_\infty \\
 &\Rightarrow |m_{p,p}| |z_p| \leq L_p \|Z\|_\infty \Rightarrow |m_{p,p}| \leq L_p \text{ (car } |z_p| = \|Z\|_\infty > 0).
 \end{aligned}$$

Ainsi, s'il existe $Z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tel que $MZ = 0$ alors $\exists p \in \llbracket 1, n \rrbracket / |m_{p,p}| \leq L_p$.

b) Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Soit $\lambda \in \sigma(A)$. La matrice $M = A - \lambda I$ n'est pas inversible et donc il existe un vecteur non nul Z tel que $MZ = 0$. Mais alors d'après a), il existe un indice p tel que $|m_{p,p}| \leq \sum_{j \neq p} |m_{p,j}|$ ou encore tel que $|a_{p,p} - \lambda| \leq \sum_{j \neq p} |a_{p,j}|$.

Cette dernière inégalité signifie que $\lambda \in D_p(A)$ et donc $\lambda \in G_L(A)$.

c) Ainsi, $\sigma_A \subset G_L(A)$. En appliquant ce résultat à ${}^t A$, on a aussi $\sigma_A = \sigma_{{}^t A} \subset G_L({}^t A) = G_C(A)$ et finalement

$$\boxed{\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \sigma_A \subset G_L(A) \cap G_C(A).}$$

II.A.3) a) On suppose que μ est une valeur propre de A située sur le bord de $G_L(A)$ et que x est un vecteur propre associé. On choisit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|x_k| = \|x\|_\infty$. D'après le travail effectué en II.A.2), on a $|a_{k,k} - \mu| \leq L_k$. Mais comme μ est situé sur le bord de A , on a aussi $|a_{k,k} - \mu| \geq L_k$ et finalement $|a_{k,k} - \mu| = L_k$. Ceci montre que $\mu \in C_k(A)$.

b) Supposons par l'absurde qu'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{k\}$ tel que $|x_i| < \|x\|_\infty = |x_k|$. Puisque $a_{k,i} \neq 0$, on a $|a_{k,i}| |x_i| < |a_{k,i}| |x_k|$ et donc

$$|a_{k,k} - \mu| |x_k| = \left| \sum_{j \neq k} a_{k,j} x_j \right| < \sum_{j \neq k} |a_{k,j}| |x_k| = L_k |x_k|.$$

Après simplification par le réel strictement positif $|x_k|$, on obtient $|a_{k,k} - \mu| < L_k$ ce qui n'est pas. Par suite, toutes les composantes de x ont même module et d'après a), $\mu \in \bigcap_{1 \leq j \leq n} C_j(A)$.

II.A.4) On a $D_p^{-1} A D_p = \left(\frac{p_j}{p_i} a_{i,j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$ et donc, $G_L(D_p^{-1} A D_p) = \bigcup_{1 \leq i \leq n} \left\{ z \in \mathbb{C} / |z - a_{i,i}| \leq \frac{1}{p_i} \sum_{j \neq i} p_j |a_{i,j}| \right\}$.

II.A.5) a) Soient $A \in M_n(\mathbb{C})$ puis $p \in \mathbb{R}^n$ tel que $p > 0$. D'après I.A.2),

$$\rho(A) = \rho(D_p^{-1} A D_p) \leq N_\infty(D_p^{-1} A D_p) = \max \left\{ \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^n p_j |a_{i,j}|, 1 \leq i \leq n \right\}.$$

Ainsi, $\rho(A)$ est un minorant de $\left\{ \max \left\{ \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^n p_j |a_{i,j}|, 1 \leq i \leq n \right\}, p > 0 \right\}$ et donc

$$\boxed{\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \rho(A) \leq \inf \left\{ \max \left\{ \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^n p_j |a_{i,j}|, 1 \leq i \leq n \right\}, p > 0 \right\}.}$$

b) i) Soit $p > 0$. Calculons la somme de tous les coefficients de la matrice $\left(\frac{p_i}{p_j} |a_{i,j}| \right)_{1 \leq i, j \leq 3}$. Puisque pour $x > 0$, on a

$\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 \geq 0$, on a encore $x + \frac{1}{x} \geq 2$ et donc

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq 3} |a_{i,j}| \frac{p_j}{p_i} &= 7 + 16 \frac{p_2}{p_1} + 8 \frac{p_3}{p_1} + 16 \frac{p_1}{p_2} + 7 + 8 \frac{p_3}{p_2} + 8 \frac{p_1}{p_3} + 8 \frac{p_2}{p_3} + 5 \\ &= 19 + 16 \left(\frac{p_1}{p_2} + \frac{p_2}{p_1} \right) + 8 \left(\frac{p_1}{p_3} + \frac{p_3}{p_1} \right) + 8 \left(\frac{p_2}{p_3} + \frac{p_3}{p_2} \right) \\ &\geq 19 + 2 \times (8 + 8 + 16) = 83. \end{aligned}$$

Si maintenant on a pour chaque $i \in \{1, 2, 3\}$ $\frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^3 p_j |a_{i,j}| < \frac{83}{3}$, alors $\sum_{1 \leq i, j \leq 3} |a_{i,j}| \frac{p_j}{p_i} < 3 \times \frac{83}{3} = 83$ ce qui n'est pas.

Donc, il existe $i \in \{1, 2, 3\}$ tel que $\frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^3 p_j |a_{i,j}| \geq \frac{83}{3}$ ou encore, $\max \left\{ \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^3 p_j |a_{i,j}|, 1 \leq i \leq 3 \right\} \geq \frac{83}{3}$.

Cette minoration étant valable pour tout $p > 0$, on a montré que

$$\inf \left\{ \max \left\{ \frac{1}{p_i} \sum_{j=1}^3 p_j a_{i,j}, 1 \leq i \leq 3 \right\}, p > 0 \right\} \geq \frac{83}{3}.$$

ii) Déterminons le polynôme caractéristique de A .

$$\begin{aligned} \chi_A &= \begin{vmatrix} 7-X & -16 & 8 \\ -16 & 7-X & -8 \\ 8 & -8 & -5-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -9-X & -16 & 8 \\ -9-X & 7-X & -8 \\ 0 & -8 & -5-X \end{vmatrix} \quad (C_1 \leftarrow C_1 + C_2) \\ &= (-9-X) \begin{vmatrix} 1 & -16 & 8 \\ 1 & 7-X & -8 \\ 0 & -8 & -5-X \end{vmatrix} = (-9-X) \begin{vmatrix} 1 & -16 & 8 \\ 0 & 23-X & -16 \\ 0 & -8 & -5-X \end{vmatrix} \quad (L_2 \leftarrow L_2 - L_1) \\ &= (-9-X)(X^2 - 18X - 243) = (-9-X)(X+9)(X-27) = -(X+9)^2(X-27). \end{aligned}$$

$$\text{Sp}(A) = (-9, -9, 27) \text{ et } \rho(A) = 27.$$


II.B - Applications

I.B.1) a) Si A est SDD, 0 n'est dans aucun des disques fermés de centre $a_{i,i}$ et de rayon L_i et donc 0 n'est pas dans σ_A d'après II.A.2). On en déduit que A est inversible.

$$\forall A \in M_n(\mathbb{C}), A \text{ SDD} \Rightarrow A \in \text{GL}_n(\mathbb{C}).$$

b) Soit $\lambda \in \sigma_A$. Il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|a_{i,i} - \lambda| \leq L_i$. Mais alors

$$\begin{aligned} \text{Re}(\lambda) &= a_{i,i} + (\text{Re}(\lambda) - a_{i,i}) \\ &\leq a_{i,i} + |\text{Re}(\lambda) - a_{i,i}| = -|a_{i,i}| + |\text{Re}(\lambda - a_{i,i})| \\ &\leq -|a_{i,i}| + |\lambda - a_{i,i}| \leq -|a_{i,i}| + L_i < 0. \end{aligned}$$



Ainsi, toutes les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative. En changeant A en $-A$, on obtient aussi : si A est SDD et si tous les $a_{i,i}$ sont des réels strictement positifs, alors toutes les valeurs propres ont des parties réelles strictement positives.

c) Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice symétrique réelle SDD. Pour $x = (x_i)_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{R}^n$, ${}^t x A x = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} x_i x_j$.

Si A est définie positive, pour chaque $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{i,i} = Q((0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)) > 0$.

Réciproquement, les tous les $\alpha_{i,i}$ sont des réels strictement positifs, d'après b), les valeurs propres de A ont toutes une partie réelle strictement positive et sont donc des réels strictement positifs (puisque A est symétrique réelle). On sait alors que A est définie positive.

En résumé, si A est une matrice symétrique réelle SDD, A est définie positive si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous des réels strictement positifs.

II.B.2) Puisque B est diagonalisable, il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_j)_{1 \leq j \leq n}$ telle que $B = PDP^{-1}$. Soit alors $E' = PEP^{-1}$. Déjà, $B + E = P(D + E')P^{-1}$ et donc $\sigma_{B+E} = \sigma_{D+E'}$.

Soit $\hat{\lambda} \in \sigma_{B+E} = \sigma_{D+E'}$. Puisque les coefficients diagonaux de la matrice $D + E'$ sont les $\lambda_j + e'_{j,j}$ et les coefficients non diagonaux sont ceux de E' , d'après la question II.A.2)b), il existe un indice i tel que

$$|\hat{\lambda} - (\lambda_i + e'_{i,i})| \leq \sum_{j \neq i} |e'_{i,j}|.$$

Pour cet indice i , on a

$$\begin{aligned} |\hat{\lambda} - \lambda_i| &\leq |\hat{\lambda} - (\lambda_i + e'_{i,i})| + |e'_{i,i}| \\ &\leq |e'_{i,i}| + \sum_{j \neq i} |e'_{i,j}| = \sum_{j=1}^n |e'_{i,j}| \\ &\leq N_\infty(E') = N_\infty(P^{-1}EP) \\ &\leq N_\infty(P)N_\infty(P^{-1})N_\infty(E) \text{ (d'après I.A.3)}. \end{aligned}$$

Le réel $N_\infty(P)N_\infty(P^{-1})$ ne dépend que de B et on peut le noter $K_\infty(B)$. On a montré que

$$\exists K_\infty(B) \in \mathbb{R}^+ / \forall E \in M_n(\mathbb{C}), \forall \hat{\lambda} \in \sigma_{B+E}, \exists \lambda_i \in \sigma_B / |\hat{\lambda} - \lambda_i| \leq K_\infty(B)N_\infty(E).$$

Partie III -

III.A - Préliminaire

III.A.1) Les fonctions c_j , $1 \leq j \leq n$, sont continues sur le segment $[0, 1]$. Il en est de même de la fonction $\sum_{j=1}^n |c_j|$. Cette fonction est en particulier bornée sur le segment $[0, 1]$. On note M un majorant de la fonction $\sum_{j=1}^n |c_j|$ sur $[0, 1]$.

Soient $t \in [0, 1]$ puis z une éventuelle racine de module supérieur ou égal à 1 de P_t dans \mathbb{C} .

$$\begin{aligned} P_t(z) = 0 &\Rightarrow z^n = - \sum_{j=1}^n c_j(t)z^{n-j} \Rightarrow |z|^n \leq \sum_{j=1}^n |c_j(t)||z|^{n-j} \\ &\Rightarrow |z|^n \leq \left(\sum_{j=1}^n |c_j(t)| \right) |z|^{n-1} \text{ (car } |z| \geq 1) \\ &\Rightarrow |z|^n \leq M|z|^{n-1} \\ &\Rightarrow |z| \leq M \text{ (car } |z| > 0). \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $t \in [0, 1]$ et toute racine z de P_t dans \mathbb{C} , on a $|z| \leq 1$ ou $|z| \leq M$ et donc $|z| \leq \max\{1, M\}$. Ainsi, si on pose $R = \max\{1, M\}$, R est un réel strictement positif tel que pour tout $t \in [0, 1]$, $Z_t \subset D(0, R)$.

$$\exists R > 0 / \forall t \in [0, 1], Z_t \subset D(0, R).$$

III.A.2) Supposons par l'absurde que

$$\exists \varepsilon > 0 / \forall \eta > 0, \exists t \in [0, 1] / |t - t_0| < \eta / \forall X_t \in Z_t, |X_t - X_0| \geq \varepsilon.$$

ε est dorénavant ainsi fixé. En particulier, pour chaque entier naturel non nul p , il existe $t_p \in [0, 1]$ tel que $|t_p - t_0| \leq \frac{1}{p}$ et $\forall X_{t_p} \in Z_{t_p}, |X_{t_p} - X_0| \geq \varepsilon$.

Déjà, puisque pour chaque $p \in \mathbb{N}^*$ on a $|t_p - t_0| \leq \frac{1}{p}$, la suite $(t_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ converge et a pour limite t_0 . Mais alors, puisque les c_j sont continues sur $[0, 1]$, la suite $(P_{t_p}(X_0))_{p \in \mathbb{N}^*}$ converge et

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} P_{t_p}(X_0) = X_0^n + \sum_{j=1}^n c_j(t_0) X_0^{n-j} = P_{t_0}(X_0) = 0 \quad (1).$$

Posons alors $Z_{t_p} = (X_{1,t_p}, \dots, X_{n,t_p})$ (Z_{t_p} désignant maintenant la famille des racines de P_{t_p} numérotées arbitrairement). D'après III.A.1), la suite $(Z_{t_p})_{p \in \mathbb{N}^*}$ est une suite bornée de \mathbb{C}^n qui est de dimension finie sur \mathbb{C} . D'après le théorème de BOLZANO-WEIERSTRASS, on peut en extraire une sous-suite $(Z_{t_{\varphi(p)}})_{p \in \mathbb{N}^*}$ convergente. Notons (Y_1, \dots, Y_n) la limite de cette suite quand p tend vers $+\infty$. Puisque pour chaque $p \in \mathbb{N}^*$ et chaque $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $|X_{j,t_{\varphi(p)}} - X_0| \geq \varepsilon$, quand p tend vers $+\infty$, on obtient $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, |Y_j - X_0| \geq \varepsilon$ et en particulier, $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, Y_j - X_0 \neq 0$.

Pour chaque $p \in \mathbb{N}^*$, on a $P_{t_{\varphi(p)}} = (X - X_{1,\varphi(t_p)}) \dots (X - X_{n,\varphi(t_p)})$ et donc $P_{t_{\varphi(p)}}(X_0) = (X_0 - X_{1,\varphi(t_p)}) \dots (X_0 - X_{n,\varphi(t_p)})$. On en déduit que

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} P_{t_{\varphi(p)}}(X_0) = (X_0 - Y_1) \dots (X_0 - Y_n) \neq 0 \quad (2).$$

(1) et (2) sont en contradiction et on a montré que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0 / \forall t \in [0, 1] (|t - t_0| < \eta \Rightarrow (\exists X_t \in Z_t / |X_t - X_{t_0}| < \varepsilon)).$$

III.B -

III.B.1) La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$ admet 0 pour valeur propre double. Comme $D_1(A)$ est le disque de centre (2, 0) et de rayon 1, $D_1(A)$ ne contient aucune valeur propre de A .

III.B.2) a) Soient $z \in \mathbb{C}$ et $t \in [0, 1]$.

$$z \in G_L(A(t)) \Rightarrow \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket / |a_{i,i} - z| \leq t \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| \Rightarrow \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket / |a_{i,i} - z| \leq \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| \Rightarrow z \in G_L(A).$$

$$\forall t \in [0, 1], G_L(A(t)) \subset G_L(A).$$

b) i) $a_{1,1}$ est le centre du disque $D_1(A)$ et est une valeur propre de $D = A(0)$. Donc, $a_{1,1} \in \sigma_{A(0)} \cap D_1(A)$ ou encore $0 \in E$.

$$E \neq \emptyset.$$

ii) Soit $t_0 \in E$. Il existe donc $\lambda_{t_0} \in \sigma_{A(t_0)} \cap D_1(A)$. Par hypothèse, λ_{t_0} n'est dans aucun des $D_j(A)$, $2 \leq j \leq n$. Soit d la distance de λ_{t_0} à $\bigcup_{j \neq 1} D_j(A)$. d est un réel strictement positif car $\bigcup_{j \neq 1} D_j(A)$ est un fermé et $\lambda_{t_0} \notin \bigcup_{j \neq 1} D_j(A)$.

On peut donc poser $\varepsilon = \frac{d}{2} > 0$ et on applique le résultat de II.A.2) aux polynômes $P_t = (-1)^n \chi_{A(t)} = \det(XI_n - (D + tB))$ (P_t étant unitaire de degré n dont les coefficients sont des fonctions de t continues sur $[0, 1]$) :

$$\exists \eta > 0 / \forall t \in [0, 1], (|t - t_0| < \eta \Rightarrow \exists \lambda_t \in \sigma(A(t)) / |\lambda_t - \lambda_{t_0}| < \varepsilon).$$

Enfin, puisque $\varepsilon < d$, le réel λ_t fourni n'est pas dans $\bigcup_{j \neq 1} D_j(A)$ mais est dans $\sigma_{A(t)}$ et donc dans $G_L(A(t))$ et donc dans $G_L(A)$ d'après a). Le réel λ_t fourni est ainsi dans $D_1(A)$. Ceci montre que $]t - \eta, t + \eta[\cap [0, 1] \subset E$.

iii) Pour chaque $k \in \mathbb{N}^*$, il existe $\lambda_{t_k} \in \sigma_{A(t_k)} \cap D_1(A)$. Mais $D_1(A)$ est un fermé borné de \mathbb{C} et donc un compact de \mathbb{C} d'après le théorème de BOREL-LEBESGUE. On peut ainsi extraire de la suite $(\lambda_{t_k})_{k \in \mathbb{N}^*}$ une suite $(\lambda_{t_{\varphi(k)}})_{k \in \mathbb{N}^*}$ qui converge vers un réel λ de $D_1(A)$.

Maintenant, pour chaque $k \in \mathbb{N}^*$, on a $\chi_{A(t_{\varphi(k)})}(\lambda_{t_{\varphi(k)}}) = 0$ et quand k tend vers $+\infty$, on obtient par continuité du déterminant

$$\chi_{A(a)}(\lambda) = \lim_{k \rightarrow +\infty} (\det(A(t_{\varphi(k)}) - \lambda_{t_{\varphi(k)}} I_n)) = 0$$

ce qui montre que $\lambda \in \sigma_{A(a)}$. Finalement, $\sigma_{A(a)} \cap D_1(A) \neq \emptyset$ et donc $a \in E$.

iv) ii) montre que E est une partie ouverte de $[0, 1]$, iii) montre que E est une partie fermée de $[0, 1]$ et i) montre que $E \neq \emptyset$. D'après le résultat admis par l'énoncé, $E = [0, 1]$. En particulier, $1 \in E$ ou encore

$$\sigma_A \cap D_1(A) \neq \emptyset.$$

III.B.3) Le résultat précédent s'applique à chaque ligne et chaque colonne de la matrice A de la question II.A.1). Cette matrice a donc au moins une valeur propre dans le disque $D_2(A)$ de centre $(-1, 1)$ et de rayon 1 et une valeur propre dans le disque $D_4(A)$ de centre $(-5, -5)$ et de rayon 3. Enfin, II.A.3)b) montre que ces deux valeurs propres ne sont à l'intérieur de ces disques.

Partie IV -

IV.A -

IV.A.1) Soit $(A, B) \in (M_n(\mathbb{C}))^2$. On pose $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$. On a

$$\begin{aligned} N_2(AB)^2 &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \left| \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} \right|^2 \\ &\leq \sum_{1 \leq i, j \leq n} \left(\sum_{k=1}^n |a_{i,k}|^2 \right) \left(\sum_{l=1}^n |b_{l,j}|^2 \right) \quad (\text{d'après l'inégalité de CAUCHY-SCHWARZ}) \\ &= \sum_{1 \leq i, j, k, l \leq n} |a_{i,k}|^2 |b_{l,j}|^2 = \left(\sum_{1 \leq i, k \leq n} |a_{i,k}|^2 \right) \left(\sum_{1 \leq l, j \leq n} |b_{l,j}|^2 \right) \\ &= N_2(A)^2 N_2(B)^2, \end{aligned}$$

et donc $N_2(AB) \leq N_2(A)N_2(B)$. On a montré que

$$N_2 \text{ est une norme matricielle sur } M_n(\mathbb{C}).$$

IV.A.2) a) Posons $D = \text{diag}(d_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $\Delta = \text{diag}(\delta_j)_{1 \leq j \leq p}$. Le coefficient ligne i , colonne j , $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$, de la matrice $D(A \times_H B)\Delta$ vaut $d_i a_{i,j} b_{i,j} \delta_j$. Ce coefficient est aussi celui des matrices $(DA\Delta) \times_H B$, $A \times_H (DB\Delta)$, $((DA) \times_H B)\Delta$, $D(A \times_H (B\Delta))$ et $(DA) \times_H (B\Delta)$.

b) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Le coefficient ligne i , colonne i , de la matrice $AD_x^t B$ vaut $\sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j b_{i,j}$ ou encore $\sum_{j=1}^p (a_{i,j} b_{i,j}) x_j$ et est aussi la i -ème composante du vecteur $(A \times_H B)x$.

c) Soient $x \in \mathbb{C}^p$ et $y \in \mathbb{C}^n$. Le coefficient ligne i , colonne i , de $D_y^* A D_x^t B$ vaut

$$y_i^* (A D_x^t B)_{i,i} = y_i^* [(A \times_H B)x]_i = \sum_{j=1}^p y_i^* a_{i,j} b_{i,j} x_j,$$

et donc

$$\text{Tr}(D_y^* A D_x^t B) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} y_i^* a_{i,j} b_{i,j} x_j = y^* (A \times_H B)x.$$

d) En supposant de plus que $n = p$, pour $x \in \mathbb{C}^n$ on a

$$x^* (A \times_H \bar{B})x = \text{Tr}(D_x^* A D_x^t \bar{B}) = \langle D_x^* A D_x, B \rangle.$$

IV.B -

IV.B.1) Soit $S \in S_n^+(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral, il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et il existe $D = \text{diag}(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in D_n^+(\mathbb{R})$ tel que $S = PD^tP$. On pose $\sqrt{D} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_i})_{1 \leq i \leq n}$ puis $T = \sqrt{D}^tP$. On a alors

$${}^tTT = P\sqrt{D}\sqrt{D}^tP = PD^tP = S.$$

$$\forall S \in S_n^+(\mathbb{R}), \exists T \in M_n(\mathbb{R}) / S = {}^tTT.$$

Si de plus, $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, $(\det T)^2 = \det(S) > 0$ et donc $\det T \neq 0$ ou encore $T \in GL_n(\mathbb{R})$.

IV.B.2) Il est clair que $A \times_H B \in S_n(\mathbb{R})$. D'après la question précédente, il existe $(T, U) \in (M_n(\mathbb{R}))^2$ tel que $A = {}^tTT$ et $B = {}^tUU$. Pour $x \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, on a d'après IV.A.1d),

$$\begin{aligned} {}^t_x(A \times_H B)x &= \langle D_x A D_x, B \rangle = \text{Tr}(D_x {}^tTT D_x {}^tUU) = \text{Tr}(U D_x {}^tTT D_x {}^tU) = \text{Tr}({}^t(T D_x {}^tU) T D_x {}^tU) = \langle T D_x {}^tU, T D_x {}^tU \rangle \\ &= N_2(T D_x {}^tU) \geq 0. \end{aligned}$$

Ceci montre que $A \times_H B \in S_n^+(\mathbb{R})$. Si de plus, A et B sont dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$, T et U sont inversibles et donc

$${}^t_x(A \times_H B)x = 0 \Leftrightarrow N_2(T D_x {}^tU) \Leftrightarrow T D_x {}^tU = 0 \Leftrightarrow D_x = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

ce qui montre que $A \times_H B \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

$$\forall (A, B) \in (S_n^+(\mathbb{R}))^2, A \times_H B \in S_n^+(\mathbb{R}) \text{ et } \forall (A, B) \in (S_n^{++}(\mathbb{R}))^2, A \times_H B \in S_n^{++}(\mathbb{R}).$$

IV.B.3) a) Les valeurs propres de la matrice symétrique $B - \lambda_{\min}(B)I_n$ sont les $\lambda - \lambda_{\min}$, $\lambda \in \sigma_B$ et sont donc des réels positifs. On en déduit que $B - \lambda_{\min}(B)I_n \in S_n^+(\mathbb{R})$. Mais alors, $A \times_H (B - \lambda_{\min}(B)I_n) \in S_n^+(\mathbb{R})$ d'après la question précédente.

b) On a ${}^t_x(A \times_H B)x = {}^t_x(\lambda(A \times_H B)x) = \lambda(A \times_H B) {}^t_x x = \lambda(A \times_H B)$ et donc

$$\begin{aligned} \lambda(A \times_H B) &= {}^t_x(A \times_H B)x = {}^t_x(A \times_H (B - \lambda_{\min}(B)I_n))x + \lambda_{\min}(B) {}^t_x(A \times_H I_n)x \\ &= {}^t_x(A \times_H (B - \lambda_{\min}(B)I_n))x + \lambda_{\min}(B) {}^t_x \text{diag}(a_{i,i})_{1 \leq i \leq n} x \\ &= {}^t_x(A \times_H (B - \lambda_{\min}(B)I_n))x + \lambda_{\min}(B) \sum_{i=1}^n a_{i,i} x_i^2 \\ &\geq 0 + \lambda_{\min}(B) \min_{1 \leq i \leq n} a_{i,i} \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ (car } B - \lambda_{\min}(B)I_n \in S_n^+(\mathbb{R}) \text{ et aussi } \lambda_{\min}(B) \geq 0) \\ &= \lambda_{\min}(B) \min_{1 \leq i \leq n} a_{i,i}. \end{aligned}$$

$$\lambda(A \times_H B) \geq \lambda_{\min}(B) \min_{1 \leq i \leq n} a_{i,i}.$$

c) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{i,i} = \min_{1 \leq j \leq n} a_{j,j}$. On note e_i le i -ème vecteur de la base canonique de $M_{n,1}(\mathbb{R})$ et on a

$$\begin{aligned} a_{i,i} &= {}^t e_i A e_i = {}^t e_i (A - \lambda_{\min}(A)I_n) e_i + \lambda_{\min}(A) {}^t e_i e_i = {}^t e_i (A - \lambda_{\min}(A)I_n) e_i + \lambda_{\min}(A) \\ &\geq \lambda_{\min}(A) \text{ (puisque } A - \lambda_{\min}(A)I_n \in S_n^+(\mathbb{R}), \end{aligned}$$

et donc $\min_{1 \leq j \leq n} a_{j,j} \geq \lambda_{\min}(A)$. Puisque $\lambda_{\min}(B) \geq 0$, d'après b) on a

$$\lambda(A \times_H B) \geq \lambda_{\min}(A) \lambda_{\min}(B).$$

d)

$$\begin{aligned}\lambda(A \times_H B) &= {}^t x(A \times_H (B - \lambda_{\max}(B) I_n))x + \lambda_{\max}(B) {}^t x(A \times_H I_n)x \\ &\leq 0 + \lambda_{\max}(B) \max_{1 \leq i \leq n} a_{i,i} \sum_{i=1}^n x_i^2 = \lambda_{\max}(B) \max_{1 \leq i \leq n} a_{i,i},\end{aligned}$$

et si i est un indice tel que $a_{i,i} = \max_{1 \leq j \leq n} a_{j,j}$

$$a_{i,i} = {}^t e_i A e_i = {}^t e_i (A - \lambda_{\max}(A) I_n) e_i + \lambda_{\max}(A) \leq \lambda_{\max}(A).$$

$$\lambda(A \times_H B) \leq \lambda_{\max}(A) \lambda_{\max}(B).$$