

Concours ENSAM - ESTP - EUCLIDE - ARCHIMEDE

Epreuve de Mathématiques A MP

Préliminaires

1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1a. D'après la formule du binôme de NEWTON,

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = \sum_{k=0}^n C_n^k \times 1^k \times 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$$

1b. Puisque les endomorphismes I et T commutent, la formule du binôme de NEWTON permet encore d'écrire

$$L^n = (I + T)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k T^k.$$

1c. Soit $u \in E$. Il est clair que pour $(k, p) \in \mathbb{N}^2$, $(T^k(u))_p = u_{p+k}$. Par suite,

$$(L^n(u))_0 = \sum_{k=0}^n C_n^k (T^k(u))_0 = \sum_{k=0}^n C_n^k u_k.$$

2. 2a. La fonction f est continue par morceaux sur \mathbb{R} et 2π -périodique. On peut donc calculer les coefficients de FOURIER de f . La fonction f est impaire. Par suite, pour tout entier naturel n , $a_n(f) = 0$, puis pour n entier naturel non nul,

$$b_n(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(t) \sin(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin(nt) dt = \frac{2}{n\pi} [-\cos(nt)]_0^\pi = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

Ainsi, $\forall p \in \mathbb{N}^*$, $b_{2p}(f) = 0$ et $\forall p \in \mathbb{N}$, $b_{2p+1}(f) = \frac{4}{(2p+1)\pi}$.

2b. f est de classe C^1 par morceaux et vérifie en tout point a de \mathbb{R} l'égalité $f(a) = \frac{1}{2}(f(a^-) + f(a^+))$. D'après le théorème de DIRICHLET, la série de FOURIER de f converge simplement vers f sur \mathbb{R} .

Les sommes partielles sont des fonctions continues sur \mathbb{R} , mais la somme de la série à savoir f , n'est pas continue sur \mathbb{R} . La série de FOURIER de f ne converge donc pas uniformément vers f sur \mathbb{R} .

2c. Pour tout réel x , on a

$$f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} b_{2p+1}(f) \sin((2p+1)x) = \frac{4}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\sin((2p+1)x)}{2p+1}.$$

Pour $x = \frac{\pi}{2}$, on obtient en particulier :

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{\pi}{2} + p\pi)}{2p+1} = \frac{4}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1}, \text{ et donc}$$

$$\boxed{\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{(-1)^p}{2p+1} = \frac{\pi}{4}.}$$

Partie I

1. 1a. Ω_p est le noyau de l'endomorphisme $T^p - I$. Par suite, Ω_p est un sous-espace vectoriel de E .

1b. • Montrons que φ est linéaire. Soient $(u, v) \in (\Omega_p)^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

$$\varphi(\lambda u + \mu v) = (\lambda u_k + \mu v_k)_{0 \leq k \leq p-1} = \lambda(u_k)_{0 \leq k \leq p-1} + \mu(v_k)_{0 \leq k \leq p-1} = \lambda\varphi(u) + \mu\varphi(v).$$

Donc, φ est linéaire.

• Montrons que φ est injective. Soit $u \in \Omega_p$.

Si $u \in \text{Ker}(\varphi)$, alors $\forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $u_k = 0$. Puisque u est p -périodique, on en déduit que pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_{n-E(n/p)p} = 0$$

(car $n - E(n/p)p \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$). Par suite, u est la suite nulle.

Puisque $\text{Ker}(\varphi) = \{0\}$, φ est injective.

• Montrons que φ est surjective. Soit $(a_0, \dots, a_{p-1}) \in \mathbb{C}^p$. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = a_{n-E(n/p)p}$. Alors, d'une part, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+p} = a_{(n+p)-E((n+p)/p)p} = a_{n+p-(E(n/p)+1)p} = a_{n-E(n/p)p} = u_n$ et la suite u est bien dans Ω_p , et d'autre part, pour $n \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $u_n = a_n$. Ainsi, u est une suite p -périodique telle que $\varphi(u) = (a_0, \dots, a_{p-1})$. On vient de montrer que $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{C}^p$ et donc que φ est surjective.

Finalement,

φ est un isomorphisme de Ω_p sur \mathbb{C}^p .

En particulier,

$$\dim(\Omega_p) = \dim(\mathbb{C}^p) = p.$$

1c. Pour $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $c^j = (\delta_{(n-j)/p, E((n-j)/p)})_{n \in \mathbb{N}}$. Par suite, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$c_{n+p}^j = \delta_{(n+p-j)/p, E((n+p-j)/p)} = \delta_{(n-j)/p+1, E((n-j)/p)+1} = \delta_{(n-j)/p, E((n-j)/p)} = c_n^j.$$

Les p suites c^j , $0 \leq j \leq p-1$ sont donc bien des éléments de Ω_p .

Montrons que la famille $(c^j)_{0 \leq j \leq p-1}$ est libre. Soit $(\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1}) \in \mathbb{C}^p$ tel que $\lambda_0 c^0 + \lambda_1 c^1 + \dots + \lambda_{p-1} c^{p-1}$ soit la suite nulle. On a alors $(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}, \lambda_0, \lambda_1, \dots) = (0, 0, \dots)$ et donc $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{p-1} = 0$.

La famille $(c^j)_{0 \leq j \leq p-1}$ est donc une famille libre de l'espace Ω_p , de cardinal $p = \dim(\Omega_p) < +\infty$. On en déduit que

la famille $(c^j)_{0 \leq j \leq p-1}$ est une base de Ω_p .

2. 2a. Si $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite p -périodique, alors la suite $T(u) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite p -périodique. Donc, Ω_p est stable par T . Puisque d'autre part Ω_p est stable par I , Ω_p est stable par $I + T = L$.

2b. Si u est dans $\text{Ker}(t)$ alors, pour tout n non nul, $u_n = 0$, puis $u_0 = u_p = 0$ (u étant p -périodique) et finalement, $u = 0$. Ainsi, $\text{Ker}(t) = \{0\}$. t est donc un endomorphisme injectif de l'espace Ω_p qui est de dimension finie. On en déduit que

$$t \in \mathcal{GL}(\Omega_p).$$

2c.

i) Soit $u \in \text{Ker}(l)$. Alors, pour $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $u_k + u_{k+1} = 0$, ou encore $\forall k \in \llbracket 0, p-2 \rrbracket$, $u_k + u_{k+1} = 0$ et pour $k = p-1$, $0 = u_{p-1} + u_p = u_{p-1} + u_0$ (car u est p -périodique).

Le p -uplet $\varphi(u)$ vérifie donc bien le système \mathcal{S} .

ii) \mathcal{S} s'écrit : $\forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $u_k = -u_{k-1}$ et $u_0 = -u_{p-1}$ ce qui équivaut à $\forall k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $u_k = (-1)^k u_0$ et $u_0 = -(-1)^{p-1} u_0 = (-1)^p u_0$.

1er cas. Si p est impair, l'équation $u_0 = (-1)^p u_0$ s'écrit $u_0 = -u_0$ ou encore $u_0 = 0$. Le système \mathcal{S} admet dans ce cas l'unique solution $(0, 0, \dots, 0)$.

2ème cas. Si p est pair, le système \mathcal{S} équivaut à $\forall k \in \{1, \dots, p-1\}$, $u_k = (-1)^k u_0$. Les p -uplets solutions de \mathcal{S} sont les p -uplets de la forme $\lambda(1, -1, 1, -1, \dots, 1, -1)$, $\lambda \in \mathbb{C}$.

iii) Si p est impair, $u \in \text{Ker}(l) \Rightarrow \varphi(u) = 0 \Rightarrow u = 0$ (car φ est un isomorphisme). Dans ce cas, $\text{Ker}(l) = \{0\}$ et l est un automorphisme de Ω_p .

Si p est pair, $u \in \text{Ker}(l) \Rightarrow \varphi(u) \in \text{Vect}((-1)^k)_{0 \leq k \leq p-1} \Rightarrow u \in \text{Vect}((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Réciproquement, puisque p est pair, la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien p -périodique et de plus, $l(((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}) = ((-1)^n + (-1)^{n+1})_{n \in \mathbb{N}} = 0$. Dans ce cas, $\text{Ker}(l) = \text{Vect}((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Si p est impair, $\text{Ker}(l) = \{0\}$ et si p est pair, $\text{Ker}(l) = \text{Vect}((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3. 3a. Pour $u \in \Omega_p$, $t^p(u) = (u_{n+p})_{n \in \mathbb{N}} = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = u$ et donc $t^p = I$. Le polynôme $X^p - 1$ est à racines simples dans \mathbb{C} (car sans racine commune avec sa dérivée pX^{p-1} dans \mathbb{C}). Ainsi, l'endomorphisme t annule un polynôme à racines simples et on sait alors que

t est diagonalisable.

3b. On sait que les valeurs propres d'un endomorphisme sont à choisir parmi les racines d'un polynôme annulateur et donc les valeurs propres de t sont à choisir parmi les racines de $X^p - 1$ qui sont les racines p -èmes de l'unité.

3c. Soient $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ et $u \in \Omega_p$.

$$t(u) = \omega_k u \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \omega_k u_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\omega_k)^n u_0 \\ \Leftrightarrow u \text{ est géométrique de raison } \omega_k.$$

La suite $\epsilon^k = (\omega_k^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite non nulle, p -périodique, de premier terme 1 et vérifie $t(u) = \omega_k u$. Ceci montre que toute racine p -ème de l'unité est valeur propre de t et donc que l'ensemble des valeurs propres de t est l'ensemble des racines p -èmes de l'unité.

La famille $(\epsilon^0, \dots, \epsilon^{p-1})$ est une famille de vecteurs propres associée à des valeurs propres deux à deux distinctes. Elle est donc libre. Puisque son cardinal est p la dimension de Ω_p , cette famille est une base de Ω_p constituée de vecteurs propres de t .

3d. Les coordonnées de ϵ^j dans \mathcal{B}_c sont aussi les coordonnées de $\varphi(\epsilon^j)$ dans $\varphi(\mathcal{B}_c)$. Or,

$$\varphi(\epsilon^j) = (\omega_j^i)_{0 \leq i \leq p-1} = \sum_{i=0}^{p-1} \omega_j^i \varphi(\epsilon^i).$$

La matrice P cherchée est la matrice de VANDERMONDE des racines p -èmes de l'unité :

$$P = (\omega_j^i)_{0 \leq i, j \leq p-1}$$

(on a numéroté les lignes et les colonnes de 0 à $p-1$).

3e. Le coefficient ligne k , colonne l de la matrice ${}^t P \bar{P}$ vaut

$$\sum_{u=0}^{p-1} \omega_k^u \overline{\omega_l^u} = \sum_{u=0}^{p-1} (e^{2i(k-l)\pi/p})^u.$$

Pour $0 \leq k, l \leq p-1$, on a

$$-p < -(p-1) \leq k-l \leq p-1 < p,$$

de sorte que $k-l \in p\mathbb{Z} \Leftrightarrow k-l = 0 \Leftrightarrow k = l$. Donc,

1er cas. Si $k = l$, $\sum_{u=0}^{p-1} \omega_k^u \overline{\omega_l^u} = \sum_{u=0}^{p-1} 1 = p$.

2ème cas. Si $k \neq l$, $e^{2i(k-l)\pi/p} \neq 1$ et $\sum_{u=0}^{p-1} (e^{2i(k-l)\pi/p})^u = \frac{e^{2i(k-l)\pi} - 1}{e^{2i(k-l)\pi/p} - 1} = 0$.

Finalement, ${}^t\bar{P} = pI_p$. En conjuguant, on obtient ${}^t\bar{P}P = pI_p$ et donc

$$P^{-1} = \frac{1}{p} {}^t\bar{P} = \frac{1}{p} (\omega_i^{-j})_{0 \leq i, j \leq p-1}.$$

4. 4a. ϵ^k est vecteur propre de t associé à la valeur propre ω_k . Donc, ϵ^k est vecteur propre de $l = I + t$ associé à la valeur propre $1 + \omega_k$. On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}$, $l^n(\epsilon^k) = (1 + \omega_k)^n \epsilon^k$. Mais alors,

$$l^n(u) = \sum_{k=0}^{p-1} x_k (1 + \omega_k)^n \epsilon^k.$$

4b. Soit $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$.

$$\frac{1 + \omega_k}{2} = \frac{1}{2} e^{ik\pi/p} (e^{ik\pi/p} + e^{-ik\pi/p}) = e^{ik\pi/p} \cos\left(\frac{k\pi}{p}\right),$$

puis

$$\left| \frac{1 + \omega_k}{2} \right| = \left| \cos\left(\frac{k\pi}{p}\right) \right|.$$

Pour $1 \leq k \leq p-1$, $0 < \frac{\pi}{p} \leq \frac{k\pi}{p} \leq \frac{(p-1)\pi}{p} < \pi$ et donc $\left| \cos\left(\frac{k\pi}{p}\right) \right| < 1$. On en déduit que

$$\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \omega_k}{2} \right)^n = 0.$$

4c. Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\frac{1}{2^n} l^n(u)_0 = \sum_{k=0}^{p-1} x_k \left(\frac{1 + \omega_k}{2} \right)^n \epsilon_0^k = \sum_{k=0}^{p-1} x_k \left(\frac{1 + \omega_k}{2} \right)^n.$$

Comme $\left(\frac{1 + \omega_0}{2} \right)^n = \left(\frac{1 + 1}{2} \right)^n = 1$, et que pour $1 \leq k \leq p-1$, $\left(\frac{1 + \omega_k}{2} \right)^n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, on en déduit que $\frac{1}{2^n} l^n(u)_0$ tend vers x_0 . Or,

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{p-1} \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ u_{p-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{p} {}^t\bar{P} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ u_{p-1} \end{pmatrix}.$$

La première ligne de ${}^t\bar{P}$ est $(\overline{\omega_0^0}, \dots, \overline{\omega_0^{p-1}}) = (1, \dots, 1)$ et donc $x_0 = \frac{1}{p}(u_0 + \dots + u_{p-1})$. Finalement,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} l^n(u)_0 = \frac{1}{p}(u_0 + \dots + u_{p-1}).$$

5. On a vu à la question 1c. du préliminaire que pour toute suite u de Ω_p , $l^n(u)_0 = \sum_{k=0}^n C_n^k u_k$. On applique ce résultat à chacune des suites c^j , $0 \leq j \leq p-1$.

Dans ce cas, u_l vaut 1 si l est de la forme $kp + j$ et 0 sinon. Donc

$$l^n(u)_0 = \sum_{0 \leq kp+j \leq n} C_n^{kp+j} = \sum_{0 \leq k \leq (n-j)/p} C_n^{kp+j}.$$

D'autre part, un et un seul des nombres u_0, \dots, u_{p-1} vaut 1 et les autres nombres sont nuls. Donc, $\frac{1}{p}(u_0 + \dots + u_{p-1}) = \frac{1}{p}$.
On a ainsi montré que

$$\forall j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} \sum_{0 \leq k \leq (n-j)/p} C_n^{kp+j} = \frac{1}{p}.$$

Partie II

1. **1a.** Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après le préliminaire,

$$\frac{1}{2^n} L^n(u)_0 - \ell = \frac{1}{2^n} (L^n(u)_0 - 2^n \ell) = \frac{1}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k - \ell \sum_{k=0}^n C_n^k \right) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k (u_k - \ell).$$

1b. Soit $n \geq N+1$.

(i).

$$\begin{aligned} |T_N(n)| &\leq \frac{1}{2^n} \sum_{k=N+1}^n C_n^k |u_k - \ell| \leq \frac{1}{2^n} \left(\sum_{k=N+1}^n C_n^k \right) \sup\{|u_k - \ell|, k \in \{N+1, \dots, n\}\} \\ &\leq \frac{1}{2^n} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k \right) \sup\{|u_k - \ell|, k \in \{N+1, \dots, n\}\} = \sup\{|u_k - \ell|, k \in \{N+1, \dots, n\}\}. \end{aligned}$$

(ii). On a déjà $|S_N(n)| \leq \frac{1}{2^n} \left(\sum_{k=0}^N C_n^k \right) \sup\{|u_k - \ell|, k \in \{0, \dots, N\}\}$. Maintenant, pour $1 \leq k \leq N$,

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \leq \frac{n \times n \times \dots \times n}{k!} = \frac{n^k}{k!},$$

ce qui reste vrai pour $k=0$. Donc, $\sum_{k=0}^N C_n^k \leq \sum_{k=0}^N \frac{n^k}{k!} = P_N(n)$. Finalement

$$|S_N(n)| \leq \frac{1}{2^n} P_N(n) \sup\{|u_k - \ell|, k \in \{0, \dots, N\}\}.$$

(iii). N étant fixé, $P_N(n)$ est un polynôme en n . D'après les théorèmes de croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^n} P_N(n) = 0$.

1c. Soit $\varepsilon > 0$. La suite u converge vers ℓ , et en particulier la suite $|u - \ell|$ est majorée. Soit M un majorant strictement positif de la suite $|u - \ell|$. Pour tout entier N , puis tout entier $n \geq N+1$, on a

$$\left| \frac{1}{2^n} L^n(u)_0 - \ell \right| \leq |S_N(n)| + |T_N(n)| \leq \frac{M}{2^n} P_N(n) + \sup\{|u_k - \ell|, N+1 \leq k \leq n\}.$$

Puisque la suite u tend vers ℓ , on peut choisir N de sorte que, pour tout $n \geq N+1$, $\sup\{|u_k - \ell|, N+1 \leq k \leq n\} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. N est ainsi orénavant fixé et pour tout entier $n \geq N+1$, on a alors

$$\left| \frac{1}{2^n} L^n(u)_0 - \ell \right| \leq \frac{M}{2^n} P_N(n) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

D'après la question précédente, $\frac{M}{2^n} P_N(n)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On peut donc fournir un entier n_0 , que l'on choisit de plus supérieur ou égal à $N+1$, tel que pour $n \geq n_0$, $\frac{M}{2^n} P_N(n) < \frac{\varepsilon}{2}$. Pour $n \geq n_0$, on a $\left| \frac{1}{2^n} L^n(u)_0 - \ell \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$.

On a montré que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / (\forall n \in \mathbb{N}), (n \geq n_0 \Rightarrow \left| \frac{1}{2^n} L^n(u)_0 - \ell \right| < \varepsilon)$, et donc que

$$\text{la suite } \left(\frac{1}{2^n} L^n(u)_0 \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } \ell.$$

2. 2a. Pour $1 \leq k \leq n$, $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$ et donc

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k s_k &= s_0 + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k s_k + s_{n+1} = s_0 + \sum_{k=1}^n C_n^k s_k + \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} s_k + s_{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k s_k + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k s_{k+1} + s_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_n^k s_k + \sum_{k=0}^n C_n^k s_{k+1} \end{aligned}$$

2b.

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k s_k - \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n C_n^k s_k = \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^n C_n^k s_k + \sum_{k=0}^n C_n^k s_{k+1} - 2 \sum_{k=0}^n C_n^k s_k \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^n C_n^k (s_{k+1} - s_k) = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^n C_n^k u_k \quad (\text{en tenant compte de } s_0 = 0) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} L^n(u)_0. \end{aligned}$$

2c. Pour $N \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{n=0}^N \frac{1}{2^{n+1}} L^n(u)_0 = \sum_{n=0}^N (S_{n+1} - S_n) = S_{N+1} - S_0 = S_{N+1} \quad (\text{somme télescopique}).$$

Par hypothèse, la suite s converge vers un complexe ℓ (où $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$). D'après la question II.1c., il en est de même de la suite $(\frac{1}{2^n} L^n(s)_0)_{n \in \mathbb{N}} = (S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ce qui démontre le résultat :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+1}} L^n(u)_0.$$

Partie III : Application

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. $J_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} C_n^k = \sum_{k=0}^n C_n^k u_k.$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une intégration par parties fournit :

$$\begin{aligned} J_n &= [x(1-x^2)^n]_0^1 - \int_0^1 x \times n \times (-2x) \times (1-x^2)^{n-1} dx = 2n \int_0^1 x^2 (1-x^2)^{n-1} dx \\ &= 2n \int_0^1 (x^2 - 1 + 1)(1-x^2)^{n-1} dx = 2n \left(- \int_0^1 (1-x^2)^n dx + \int_0^1 (1-x^2)^{n-1} dx \right) \\ &= 2n(-J_n + J_{n-1}), \end{aligned}$$

et donc, $(2n+1)J_n = 2nJ_{n-1}$. Finalement,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, J_n = \frac{2n}{2n+1} J_{n-1}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on en déduit que :

$$J_n = \frac{2n}{2n+1} \times \frac{2n-2}{2n-1} \times \dots \times \frac{2}{3} J_0 = \frac{((2n)2(n-1)\dots(2.1))^2}{(2n+1)(2n)\dots 2.1} = \frac{2^{2n} n!^2}{(2n+1)!}.$$

3. On a vu au préliminaire que la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{2n+1}$ converge et que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{\pi}{4}$. Puisque $J_n = L^n(u)_0$, on déduit de la question II.2c. que la série de terme général $\frac{1}{2^{n+1}} J_n$ converge et a même somme. Comme $\frac{1}{2^{n+1}} J_n = \frac{2^{n-1} n!^2}{(2n+1)!}$, on a montré que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n-1} n!^2}{(2n+1)!} = \frac{\pi}{4}.$$

4. 4a. Il revient au même de dire que $\pi - \sum_{n=0}^{N_1} \frac{2^{n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} \leq 10^{-1}$. Or,

$$\sum_{n=0}^0 \frac{2^{n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} = 2, \quad \sum_{n=0}^1 \frac{2^{n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} = 2 + \frac{4}{6} = 2,66\dots, \quad \sum_{n=0}^2 \frac{2^{n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} = 2 + \frac{2}{3} + \frac{8.4}{120} = 2 + \frac{2}{3} + \frac{4}{15} = \frac{44}{15} = 2,93\dots,$$

puis $\sum_{n=0}^3 \frac{2^{n+1} (n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{44}{15} + \frac{16.6^2}{7!} = \frac{44}{15} + \frac{4}{35} = \frac{320}{105} = 3,047 > \pi - 0,1$. Donc, $N_1 = 3$.

4b. Les premières valeurs de la suite $4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$ sont

$$4, \frac{8}{3} = 2,66\dots, \dots, 4\left(1 - \frac{1}{3} + \dots - \frac{1}{19}\right) = 3,0418\dots \text{ et donc } N_2 = 9.$$

4c. On a $N_1 < N_2$. On ne peut rien conclure.