

**BACCALAUREAT GENERAL**

**Session 2005**

---

**MATHEMATIQUES**

**Série S**

**ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE**

*Durée de l'épreuve : 4 heures*

*Coefficient : 7*

**Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,  
conformément à la réglementation en vigueur.**

**Du papier millimétré est mis à la disposition du candidat.**

*Le sujet est composé de 4 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies.*

**Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 5 pages numérotées de 1 à 5.**

## EXERCICE 1 (4 points )

### Commun à tous les candidats

Pour chacune des huit affirmations (entre guillemets) ci-dessous, préciser si elle est vraie ou fausse. **Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la mention « vrai » ou « faux ».** Une réponse correcte rapporte 0,5 point, une réponse incorrecte enlève 0,25 point, l'absence de réponse n'apporte ni n'enlève aucun point. Un éventuel total négatif sera ramené à 0.

1) « Si  $a$  est un nombre réel quelconque et  $f$  est une fonction définie et strictement décroissante sur  $[a; +\infty[$ , alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ . »

2) Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $[0; +\infty[$ ,  $g$  ne s'annulant pas :

$$\text{« Si } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et si } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = -1. \text{ »}$$

3) « Si  $f$  est une fonction définie sur  $[0; +\infty[$  telle que  $0 \leq f(x) \leq \sqrt{x}$  sur  $[0; +\infty[$  alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ . »

4) On considère un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  du plan.  
« Si  $f$  est une fonction définie sur  $\mathbb{R}^*$  alors la droite d'équation  $x = 0$  est asymptote à la courbe représentative de  $f$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . »

5) « La fonction  $f$  définie par  $f(x) = (x^2 + 3x + 1)e^x$  est une solution sur  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle  $y' - y = (2x + 3)e^x$ . »

6) Soient  $A, B, C$  trois points du plan. On appelle  $I$  le barycentre des points  $A$  et  $B$  affectés respectivement des coefficients 3 et  $-2$ .  
« Si  $G$  est le barycentre des points  $A, B$  et  $C$  affectés respectivement des coefficients 3,  $-2$  et 1 alors  $G$  est le milieu du segment  $[CI]$ . »

7) Soient  $A, B, C$  trois points du plan et  $G$  le barycentre de  $A, B$  et  $C$  affectés respectivement des coefficients 3,  $-2$  et 1.  
« L'ensemble des points  $M$  du plan tels que  $\|3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 1$  est le cercle de centre  $G$  et de rayon 1. »

8) Soient  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan. On désigne par  $M$  un point quelconque du plan.  
« Le produit scalaire  $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$  est nul si et seulement si  $M = A$  ou  $M = B$ . »

## EXERCICE 2 (3 points )

### *Commun à tous les candidats*

Un fabricant d'écrans plasma teste une première fois ses appareils à la sortie de la chaîne de fabrication.

Si le test est positif (c'est-à-dire si l'écran fonctionne correctement), l'écran est acheminé chez le client. Sinon l'écran retourne en usine où il est réparé puis testé une seconde fois. Si ce deuxième test est positif, l'écran est acheminé chez le client, sinon il est détruit.

Une étude statistique a permis de montrer que le test est positif pour 70% des écrans neufs sortis directement des chaînes de fabrication. mais que parmi les écrans réparés, seulement 65% d'entre eux passent le second test avec succès.

On note  $T_1$  l'événement : « le premier test est positif ».

On note  $C$  l'événement : « l'écran est acheminé chez le client ».

1) On choisit un écran au hasard à la sortie de la chaîne de fabrication.

Déterminer les probabilités des événements  $T_1$  et  $C$ .

2) La fabrication d'un écran revient à 1000 € au fabricant si l'écran n'est testé qu'une fois.

Cela lui coûte 50 € de plus si l'écran doit être testé une seconde fois.

Un écran est facturé  $a$  euros ( $a$  étant un réel positif) au client.

On introduit la variable aléatoire  $X$  qui, à chaque écran fabriqué, associe le « gain » (éventuellement négatif) réalisé par le fabricant.

a) Déterminer la loi de probabilité de  $X$  en fonction de  $a$ .

b) Exprimer l'espérance de  $X$  en fonction de  $a$ .

c) A partir de quelle valeur de  $a$ , l'entreprise peut-elle espérer réaliser des bénéfices ?

### EXERCICE 3 (8 points )

*Commun à tous les candidats*

#### Partie A

On considère la suite  $(u_n)$  définie par :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt.$$

1) Montrer que la fonction  $f : t \mapsto (2-t)e^t$  est une primitive de  $g : t \mapsto (1-t)e^t$  sur  $[0; 1]$ . En déduire la valeur de  $u_1$ .

2) Montrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout  $n$  non nul,

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1 \quad (R).$$

#### Partie B

1) On regarde d'abord ce qu'affichent deux calculatrices différentes pour les valeurs approchées des 25 premiers termes de la suite  $(u_n)$  en utilisant pour le calcul la relation de récurrence  $(R)$  ci-dessus.

Voici les résultats affichés par ces deux calculatrices :

Valeur de $n$	Valeur de $u_n$ affichée par la première calculatrice	Valeur de $u_n$ affichée par la deuxième calculatrice
1	7,188182845E-01	7,1828182846E-01
2	4,3656365691E-01	4,3656365692E-01
3	3,09690907075E-01	3,0969097076E-01
4	2,3876388301E-01	2,3876388304E-01
5	1,9381941508E-01	1,9381941520E-01
6	1,6291649051E-01	1,6291649120E-01
7	1,4041543358E-01	1,4041543840E-01
8	1,2332346869E-01	1,2332350720E-01
9	1,0991121828E-01	1,0991156480E-01
10	9,9112182825E-02	9,115648000E-02
11	9,0234011080E-02	9,0272128000E-02
12	8,2808132963E-02	8,3265536000E-02
13	7,6505728522E-02	8,2451968000E-02
14	7,1080199309E-02	1,5432755200E-01
15	6,6202989636E-02	1,3149132800E+00
16	5,9247834186E-02	2,0038612480E+01
17	7,2131811612E-03	3,3965641216E+02
18	-8,7016273909E-01	6,1128154189E+03
19	-1,7533092042E+01	1,1614249296E+05
20	-3,5166184085E+02	2,3228488592E+06
21	-7,3858986580E+03	4,8779825043E+07
22	-1,6249077047E+05	1,0731561499E+09
23	-3,7372887209E+06	2,4682591448E+10
24	-8,9694930302E+07	5,9238219474E+11
25	-2,2423732585E+09	1,4809554869E+13

Quelle conjecture peut-on faire sur la convergence de la suite  $(u_n)$  quand on examine les résultats obtenus avec la première calculatrice ? Et avec les résultats obtenus avec la deuxième calculatrice ?

### Partie C

Dans cette partie on se propose d'étudier ma suite  $(u_n)$  à partir de la définition :

$$\text{pour tout entier naturel } n \text{ non nul, } u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt.$$

- 1) Montrer que pour tout entier naturel  $n$  non nul,  $u_n \geq 0$ .
- 2) a) Montrer que pour tout réel  $t$  de l'intervalle  $[0; 1]$  et pour tout entier naturel non nul  $n$

$$(1-t)^n e^t \leq e \times (1-t)^n.$$

b) En déduire que pour tout  $n$  non nul,  $u_n \leq \frac{e}{n+1}$ .

- 3) Déterminer la suite  $(u_n)$ .

### Partie D

Dans cette partie, on se propose d'exploiter la relation de récurrence  $(R)$  vérifiée par la suite  $(u_n)$ .

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1.$$

Etant donné un réel  $a$ , on considère la suite  $(v_n)$  définie par :

$$v_1 = a \text{ et pour tout entier naturel non nul } n, v_{n+1} = (n+1)v_n - 1.$$

- 1) En utilisant le raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel non nul  $n$ ,  $v_n = u_n + (n!)(a + 2 - e)$  où  $n!$  désigne le produit des  $n$  premiers entiers naturels non nuls.
- 2) Etudier le comportement de la suite  $(v_n)$  à l'infini suivant les valeurs de  $a$ . (On rappelle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$ .)
- 3) En déduire une raison susceptible d'expliquer les résultats affichés par les deux calculatrices.

## EXERCICE 4 (5 points )

### *Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité*

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormal direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ . Unité graphique : 0,5cm.

On note  $j$  le nombre complexe  $e^{i\frac{2\pi}{3}}$ .

On considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives  $a = 8, b = 6j$  et  $c = 8j^2$ .

Soit  $A'$  l'image de  $B$  par la rotation de centre  $C$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

Soit  $B'$  l'image de  $C$  par la rotation de centre  $A$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

Soit  $C'$  l'image de  $A$  par la rotation de centre  $B$  et d'angle  $\frac{\pi}{3}$ .

- 1) Placer les points  $A, B, C, A', B'$  et  $C'$  dans le repère donné.
  
- 2) On appelle  $a', b'$  et  $c'$  les affixes respectives des points  $A', B'$  et  $C'$ .
  - a) Calculer  $a'$ . On vérifiera que  $a'$  est un nombre réel.
  - b) Montrer que  $b' = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ . En déduire que  $O$  est un point de la droite  $(BB')$ .
  - c) On admet que  $c' = 7 + 7i\sqrt{3}$ .  
Montrer que les droites  $(AA'), (BB')$  et  $CC'$  sont concourantes en  $O$ .
  
- 3) On se propose désormais de montrer que la distance  $MA + MB + MC$  est minimale lorsque  $M = O$ .
  - a) Calculer la distance  $OA + OB + OC$ .
  - b) Montrer que  $j^3 = 1$  et que  $1 + j + j^2 = 0$ .
  - c) On considère un point  $M$  d'affixe  $z$  du plan complexe.  
On rappelle que  $a = 8, b = 6j$  et  $c = 8j^2$ .  
Déduire des questions précédentes les égalités suivantes :

$$|(a - z) + (b - z)j^2 + (c - z)j| = |a + bj^2 + cj| = 22.$$

- d) On admet que, quels que soient les nombres complexes  $z, z'$  et  $z''$  :

$$|z + z' + z''| \leq |z| + |z'| + |z''|.$$

Montrer que  $MA + MB + MC$  est minimale lorsque  $M = O$ .